


PP-C66532 1738/18099 0250 19,5 + 12,5 1,2,0 N 33194 ссть электро:



1792° 66 ноябре дана 1930° 66 москее

C66532

ВРАЧЕБНЫЯ НАСТАВЛЕНІЯ

0

ЛЮБОСТРАСТНЫХЪ БОЛЪЗНЯХЪ,

кои приключаются въ разныхъ частяхъ человъческаго тьла,

сочиненныя

Сласным врагем В. Г. ПЛЕНКОМБ.

СЪ Латинскаго на Россійскій языкЪ

преложилъ

2532

НЕСТОРЪ МАКСИМОВИЧЬ - АМБОДИКЪ

Надворный Совъшникъ,

Медицины Докторъ и Профессоръ повивальнаго искусства.

Подъ въдъниемъ Государственной Медицин-

50R

Во градъ С. Петра.

Печатано при Император. Акад. Наукъ.

1790 года. энбургская применя облистена PP-C-66532 616.5 17-38

Ньто ни единаго столь сильнаго средства, могущаго предбохранить ото необузданной похоти, како сте, когда кто састо и со вниманіемо стането разсматривать тв нестастньйшія, любострастнымо недугомо сню-даемыя жертвы, кои во особыхо больницахо, наросито для врасеванія сея бользи усреженныхо, собранны находятся.

фонъ Соптенъ.

его превосходительству ЕГОРУ АЛЕКСАНДРОВИЧУ

наумову,

ГЕНЕРАЛУ МАІОРУ,

Военной коллегіи

члену,

ГЕНЕРАЛЪ-КОНТРОЛЕРУ,

И

ордена св. Владимира 2 степени

кавалеру,

Милостивому Государю,

Усерднъйшее приношение.

ми Лостивый госу ДАРЬ!

Угодно было вашему превосходительству препоругить мнв переводъ сея нужныя и преполезныя книги, именуемыя; врачебныя насшавленія о любострастныхъ бользняхъ, приключающихся въ разныхъ частяхъ человъческаго тьла; которую преложенную на россійскій языкд, и вперывые нынь напетатанную иждивениемь вашимь, посвящаю имени вашего превосходительства, яко плодб попетительному, виновнику, сего принадлежащій. Сколь для меня было лестно и пріятно видёть и слышать отб собственных дуств вашихв, тто вы милостивый государь! и последнія минуты, отб исправленія воинскаго званія вашего остающіяся, изволите улотреблять на ттение врагебных в сотиненій! Коликимо удовольствіемо восхищались вы, предвидя будущую и отб сего согиненія пользу! Во самомо діль, полегением вашимв, грезв сие доставляется телерь лугшій и надежнійшій слособо, ко 4,6pa-

увратеванію той оласной и ловсюду укоренившейся бользни, которая погти вездъ всякій возрасть и поль заражаеть. Симб одолжены вамб будутб особлибо ть сожальнія достойные юноши, кои слѣпо иногда слѣдуя волненію необузданных в страстей, сод влавшись больными, безразсудно стыдятся, просить совъта, помощи и наставленія в семь слугав у благоразумнаго врата или лекаря. О! когда бы Россійское общество получило отб сего новаго преложеннаго согиненія столько пользы, сколько оную уже востувствовали всё тё, кои вёдая языко, на коемъ оно отъ изобрътателя издано, давно уже имб пользуются! Съ симъ желаніемъ, имъю стастіе быть всегда со глубогайшим погитаниемъ.

Милостивый государь.

вашего превосходительства

Всепокорныйший слуга

Н. Максимовить-Амбодикь.

ПРЕДИСЛОВІЕ

Отб согинителя.

Каждому врачу, въ цълишельной наукъ упражняющемуся извъсшно, что ни одна бользнь, не токмо въ многолюдныхъ городахв, но даже и вв самыхв малыхв деревенских в селеніях в, столь частою не бываваешь, какъ любострастная, или вообще называемая французская. Для сея причины весьма прилично оную назвать можно безпрерывною и пошаенно вездъ распространяющеюся заразою; кошорою юноши превосходных в дарованій, въ самомь цвътущемь ихъ возрасть, либо совстыв отв человъческих в обществы истребляются, либо повреждаются и обезображиваются такъ, что къ отправленію разных должностей совершенно неспособными дълающся. А какЪ насшоящая заразишельная бользнь, или прилипчивая чума, ръдко случаешся; напрошивь того любоспраспная зараза всегда и вездъ свиръпствуенъ; въ разсуждении сего, со врачемъ Мидомъ, смъло могу сказать, что весь человический родь давно бы уже от любострастнаго яда искоренился, если бы жестокая сея заразы свиръпость, сЪ съ того времени, какъ оная въ наши страны вывезена, сама собою не ослабъла, и новоизобрътеннымъ противудъйствующимъ лъкарственнымъ средствомъ укрощена и обезсилена не была.

Сїя прегнюсная бользнь, купно со прочими заразами, имьеть общее сїе, что одна токо нечистая женщина можеть заразить многія семейства, села, деревни, и многолюдныя общества; какь вы томы нась удостовыряють многія врачебныя наблюденія, нады кормилицами, любострастнымы ядомы зараженными, учиненныя.

Сверхъ того, сїя бользиь часто отъ родителей сообщается не токмо собственнымь ихъ дътямь, но и поздымь ихъ потомкамь, обыкновенно бываеть наслъдственною, и причиняеть разныя многообразныя бользни, коихъ угадка и льченїе весьма часто врачей обманывають. Напосльдокъ не столько сїя самая зараза, сколько худое и неисправное льченїе, погубляють многихъ людей, оною страждущихъ; ибо едва не каждый деревенскій мужикъ, бородобрый, площадный лыкарь или шарлатань, а особливо прислужливыя старушки, пользуясь чужею легковърностію, въ тайнь осмъливаются предпринимать

льченіе таковых волящих в; а особливо по тому, что таковые несчастные больные, будучи угрызаемы совьстію, что они нькогда пользовались скрытными любовными дылами, безразсудно стыдятся вы семы случат просить совыта и наставленія у благоразумнаго врача или лькаря.

Для сихъ то причинъ я имъю обыкновеніе, каждаго года моимъ слушашелямъ преподавашь целой кругь лекцій особо о любоспраспных в бользняхв; симв самым порядкомЪ, коимЪ и здъсь оныя читателю предлагаю. Мой образець льченія сея бользни, посредствомь камединной ртути, о коемь отъ меня сообщено свъту еще въ 1766 году, снова нынь похваляю и въ дъйсшво оной производишь совъщую. Сте я дълаю не изъ пустаго пщеславія, не съ шъмъ намъреніемь, дабы чрезЪ то получить только имя изобрътателя, и не для того, чтобъ славнымъ во врачебномъ искусствъ мужамъ прошивуръчить. Таковая глупая дерзость и неблагодарность совсъмъ прошивны моему намъренію. Но единственно сте творю, искусившись въ томъ двадцапилъшнею моею практикою; въ продолжени кошорой, св великимъ успъхомъ производиль я вь дъйство сей же самый обра-)(3 зецъ зець льченія для многочисленных больных в, коих в прошчіе ршушьные составы медлишельнье, или опаснье выпользовали, либо не совершенное им вриносили врачеваніе. На посльдок опыты вы разных в иностранных в государствах в, как в то вы Англіи, Франціи, Швеціи и вы других вобластях в, от ученых в мужей, нады камединною ртутью учиненные, удостовьрили и самаго меня вы том в, что мой образець льченія заразительной бользни есть дыйствителень и благоустышень.

А какъ я самъ дозналъ собственнымъ опытомъ, чрезъ цълые два года сряду еще и то, что оптумъ, т. е. маковой сокъ, или сонное зълье имъетъ въ сей же бользни преудивительное дъйствте; того ради весьма часто въ моей практикъ смъшивая сте лъкарство со ртупью, употребляю какъ внъ такъ и внутренно.

Въ прочемъ, сверхъ порядка способствующаго ко преподаванію Академическихъ лекцій, какую именно еще другую пользу произвелъ я симъ сочиненіемъ моимъ; о томъ другимъ ученымъ людямъ впредъ судить предъоставляю.

оглавление содержаний.

Ya	cmz	лер	ean.
----	-----	-----	------

стран.
1. О бользняхь любострастныхь во-
обще.
Бользип внышийя любострастныя.
THE THE PARTY OF T
II. Бользии Авторо днаго у да мужескаго. т. penis.
Бълая грыжа любострастная. Gonorrhaea. 13.
Трудное мочешечение. Dyfuria. 20.
Мочезадержанте или запоръ мочи. Ifchuria. 22.
Пузырки крисшалловидные Veficulae cryffalli-
nae. — — — 26.
Пупырышки и бугорки дътороднаго уда му-
жескаго. Tubercula penis. — 27.
Язвы плъшки. Vlcera glandis. 28.
Шанкръ. Cancer glandis. 29.
Язвы мочеиспускащельнаго ствола. Vlcera
irethrae. — 31.
Hезалупа. Phymosis. 32.
Залупа незалупная. Paraphymosis. 34.
Пріапизмъ, напряженіе или возстаніе пло-
mu. Priapismus. — 35.
Похоть любострастная. Satyriasis. 36.
Корча или скорчение плоти. Curvatura penis. 37.
Невстаниха, jmpotentia virilis. 39.
III. Бользни съменниковъ или я деръ. Morbi
testiculorum.
Воспаление ядерь. Testiculorum inflammatio. 40.
Затвердълость ядеръ. — induratio. 41.
Язвы мошенки. Ulcera scroti. 42.
IV. Бользни предстательной жельзы. Могы
glandulae prostatae.
Воспа-
DOCHA-

Воспаленіе. Prostatae inflammatio.	44.
Нарывъ. — abscessus.	46.
Скирръ или окръплая зашвердълость.	
fcirrhus.	48.
V. Бользни промежности проходной и	30 4-
няго прохода. Morbi perinaei et ani.	***
Свищь промежности проходной. Fistula perina	ei.50-
Свищъ задняго прохода. Fistula ani.	52.
Сожащие. Arctura ani.	53.
Опухоли или наращенія. Condylomata.	-
VI. Болазни лаховыя. Morbi inguinum.	
Паховики. Bubones.	56.
Затвердълость Окрыплость сала, или и	пука.
Physconia. —	62.
VII. Болвзни закожныя. Morbi cutanei.	F
Пяшна. Maculae.	3 -
Чесотка. Scabies.	63.
Тръщины. Rhagades.	1 -
Пупырышки. Pfydracia. —	64.
Лишаи. Herpes.	65.
Струпья головныя. Тіпеа.	
Низпадение власовъ. Агоресіа.	66.
Порча ногшей. Unguium corruptio.	67.
Зудь, или свербежь. Pruritus.	-
Проказа. Lepra.	68.
Язвы. Ulcera.	69.
VIII. Бользни осныя. Morbi oculorum.	
Окобольніе. Ophthalmia.	70.
Гноешеченіе. Lippitudo.	73.
Пяшна роговой оболочки. Corneae maculae	
Язвы. — ulcus. —	75.
Загноеніе очной камеры. Нурорушт.	76.
Свищъ слезный. Fistula lācrymalis.	77.
Ячменець. Hordeolum.	
	SEAR-

	оглавление содержании.	VII.
	Бъльмо. Cataracta.	78.
	Слъпота или помрачение зръния. Amaurosis.	
TV		
IV	. Бользни ушныя. Merbi aurium. Глухота. Cophosis.	80.
	Гноешеченїе. Otorrhaea.	-
V		
77.	Бользни носовыя. Morbi narium. Насморкь. Coryza. —	82.
	Язва носовая. Одаепа.	83.
	Безобразіе носа. Deformitas nasi.	84.
	Безгласіе. Paraphonia.	85.
XI	. Бользни устныя. Morbi oris.	
	Молочница. Aphthae. —	86.
	Язвы нюба. Vlcera palati.	88.
	Чесотка или короста брады. Scabies menti	
XI	II. Болъзни выйныя и гортанныя. Morbi	
	et faucium.	
	Зобы выйные. Scrophulae.	
	Жаба. Angina.	90.
XI	III. Бользни костныя. Morbi offium.	
	Костная опухоль. Торния. —	92.
	Коспиый наросшь. Hyperostosis.	94.
	Косшевдица. Caries.	95.
	Тниль внутрькостная. Spina ventofa.	96.
	Размятчение костей. Mollities.	97.
	Ломкость. Fragilitas.	98.
X	IV. Бользни сленовь. Morbi articulationum.	
	Опухоли. Ganglia.	99.
	Соращенія. Anchylofis. —	100.
X	V. Бользни любострастныя женскаго з	пола.
	Morbi venerei mulierum.	
	Теченіе были. Morbi genitalium muliebrium.	102.
	Воспаление дътородных в частей. Leucoi	The same of
	haca.	106.
	За	твер.

VIII. оглавление содержаний.

Затвердьлость дьтородных в частей. Ph	10-
golis genitalium.	108.
Язвы внъщнія. Ulcera vuluae.	109.
Язвы рукава машки. — vaginae.	111.
XVI. Бользни матки. Morbi uteri.	
Прекращение кровошечения. Menostasia.	114.
Уязвление машки. Exulceratio uteri.	115.
Воздушно-водяная бользнь. Timpanites uteri	. 116.
XVII. Бользни сосцоев, Morbi mammarum.	
Воспаление сосцовь. Mammarum inflammatio	. 117.
Язва. — ulcus. —	118,
РакЪ. — Carcinoma. —	119.
Частз еторая.	
Of Read Service Control of the Contr	1
Бользни внутреннія любострасть	1215
I. Апхорадки любострастныя. Febres ven	
Лихорадка любострастная простая. Vene	
Total server pacinitary in poemarie vente	lea
fimplex.	122,
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria.	122,
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлънная. — lenta.	122,
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлънная. — lenta. — Желчная. — biliofa.	122. 123. 124.
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлънная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens.	122. 123. 124.
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлънная. — lenta. — Желчная. — biliofa.	122. 123. 124.
іmplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медльнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корги. Spasmi.	122. 123. 124.
fimplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлънная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens.	122. 123. 124. — 125.
іmplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлѣнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корси. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая болѣзнь. Epilepsia.	122. 123. 124. 125. 126. 127.
іmplex. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлѣнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корги. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая болѣзнь. Epilepsia. П. Болѣзни разслабляющія тъло. Adyna	122. 123. 124. 125. 126. 127.
Гітріех. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлѣнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корти. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая болѣзнь. Epilepsia. П. Болѣзни разслабляющія тѣло. Адупа. Слабость. Languor. —	122. 123. 124. 125. 126. 127.
Пиррех. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медльнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корги. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая бользнь. Epilepsia. И. Бользни разслабляющія тыло. Adyna Слабость. Languor. Параличь нижнихъ удовъ. Paraplegia.	122. 123. 124. 125. 126. 127. miae. 128.
— Воспалительная. — inflammatoria. — Медльная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корси. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая бользнь. Epilepsia. И. Бользни разслабляющая тыло. Adyna. Слабость. Languor. Параличь нижнихы удовы. Paraplegia. — Половины тыла. Hemiplegia.	122. 123. 124. 125. 126. 127.
бітріех. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлѣнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корти. Spaſmi. Судорга повсюдная. Теtanus. Падучая болѣзнь. Еріlербіа. ИІ. Болѣзни разслабляющія тѣло. Адупа Слабость. Languor. — Параличь нижнихъ удовъ. Paraplegia. — Половины тѣла. Hemiplegia. IV. Боли. Dolores.	122. 123. 124. 125. 126. 127. miae. 128.
Птрех. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медльнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корси. Spasmi. Судорга повсюдная. Tetanus. Падучая бользнь. Epilepsia. ИІ. Бользни разслабляющія тыло. Adyna Слабость. Languor. — Параличь нижнихь удовь. Paraplegia. — Половины тыла. Hemiplegia. IV. Боли. Dolores. Главобольніе. Сернаваеа.	122. 123. 124. 125. 126. 127. miae. 128. 129.
бітріех. — Воспалительная. — inflammatoria. — Медлѣнная. — lenta. — Желчная. — biliofa. — Перемежающаяся. — intermittens. П. Судорги и корти. Spaſmi. Судорга повсюдная. Теtanus. Падучая болѣзнь. Еріlербіа. ИІ. Болѣзни разслабляющія тѣло. Адупа Слабость. Languor. — Параличь нижнихъ удовъ. Paraplegia. — Половины тѣла. Hemiplegia. IV. Боли. Dolores.	122. 123. 124. 125. 126. 127. miae. 128.

оглавление содержаний.	IX.
Колошье грудное. Pleurodine.	132.
Колотье в животь. Colica,	133.
Ломота. Arthritis.	134.
Простуда. Rheumatismus.	135.
Illiarpa. Ifchias.	-
Боль костная. Osteocopus.	136.
V. Бользии Грудныя. Anhelationes.	
Одышка или задохЪ. Дубрноеа.	137.
Кашель. Tuffis.	238.
Хрипота, Raucitas.	139.
VI. Бользненныя тесенія мокроть: Proflu	via.
Слиношечение. Ptyalismus.	140.
Безпрерывный позывь кь испражнению низ	вомЪ.
Tenesmus.	_
Thoemeчение задняго прохода. Proctorrhaea.	141.
Moчетечение гнойное. Pyuria.	-
VII. Бользни изнурительныя. Emaciationes.	
Изсушение півла. Atrophia,	142.
Сухотка. Tabes.	143.
Чахошка. Phthyfis.	145.
VIII. Бользни жень беременныхь. lues gra-	vi-
darum.	146.
IX. Бользни младенческія. — infantum.	147.
Х. Бользни скрышныя. — latentes.	151.
XI. Бользни многообразныя. — laruatae.	152.
XII. Бользни многосложныя. — complicatae.	154.
XIII. Предъохранение от любострастной б	0-
лъзни. luis prophylaxis.	160.
Часть третья.	
	1
I Врачебныя предписанія. Formulae medicae	
1) Внутреннія. Internae.	162.
II) Внѣшнія. Externae.	174.

Х. отлавление содержаний.

II. Врачебныя примъчанія на объ предъидущія части. Annotationes medicae. 182.

III. Алфавишное оглавление содержаний, кои во всъхъ трехъ частяхъ заключаются. Elenchus contentorum per alphabethum.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

О внышнихълюбострастныхъ бользняхъ.

отдъление і.

Обб оных в бол взнях в вообще.

- 1. Бользни от любострастнаго яда происходящія, называются Венерическими, Французскими, или любострастными.
- 2. Морскій флоть Христофора Колумба съ собою вывезль сей ядь въ Европу изъ Американскихъ острововь, по повъстямь, въ 1493 лъто.
- 3. По томь при осадъ Неаполя сей ядь такь распространился повсюду, что отв войскь осаждавшихь оной городь названь французскою; от осажденныхь же вы томь городь Неаполитанскою; а от привезшихь сте новое эло вы Гишпантю, названь онь Гишпанскою бользно.
- 4. Ядь любострастный кажется быть отродкомь Американской бользни, явся называемой, найболье островамь Антильскимь свойственной.
- 5. Стю бользнь ожесточаеть и усиливаеть климать такь, что даже и вы наши времена любострастная бользнь тьмы болье

Часта І.

свиръпствуеть, чъмь ближе земная страна къ съверу клонится.

- 6. Сїя новая зараза съ перьваго своего начала въ Европъ несравненно свиръпъе была; ибо вскоръ все тъло от нея покрывалось гнуснъйшими язвами и опухолями: но съ продолжентемъ времени жестокость ея мало по малу сама собою умалилась.
- 7. Свойства сея заразы суть во всемь отличны от всъхъ прочихъ, по сте время извъстныхъ остротъ и прилипчивыхъ заразъ; слъдственно она есть зараза особливато своего рода. А бываетъ сей ядъ
 - 1). Тончайшій; ибо онъ вкрадывается въ найтончайшіе сосудцы и скважинки человьческаго тьла.
 - 2). Постоянный; ибо еще ни однимы опытомы не доказано, чтобы кто ни есть оты одного испаренія, безы сообщенія или прикосновенія кы самой заразы, оною заражены содылался.
 - 3) Воспалишельный от воздуха; ибо он раздражая медльнныя вожжен я, причиняет воспалишельное згущен в соках и медлишельныя язвы.
 - 4) Имбющій ближайшее сходство съ клейкими возгривыми и маслеными соками; по чему, онб столь часто заражаеть возгривыя жельзы и кости.

 5)

- 5) Ни кислый, ни щолочный, ни алкалическій, ни гніючій, ни сольный.
- 6) Ночью найболье и жесточье свирыствую-
- 7) Одною ртутью истребляемый.
- 8) Никогда въ человъческомъ тълъ нераждающійся, но всегда въ оное отбинуда воспріемлемый.
- 8. Образъ или способъ, коимъ сей ядъ обыкновенно въ человъческое тъло воспріемлется, есть четверакій:
 - 1) Порожденіем то от зараженной матери, сообщающей утробному своему плоду сей ядь со кровію. Можеть ли отець имьющій зараженное сьмя, заразить симь же ядомь и свое исчадіе безь матерней заразы? Сіе сомнительно быть кажется.
 - 2) ВоздоеніемЪ. ТакимЪ то образомЪ часто какЪ младенцы отъ зараженной кормилицы, такъ и здоровыя кормилицы отъ зараженнаго младенца повреждаются.
 - 3) Плотскимъ совокупленіемъ здороваго мущины съ женщиною страждущею заразительнымъ теченіемъ бѣли, или здоровой женщины съ мущиною страждущимъ заразительною бѣлою грыжею. Сей образъ заразительности есть найчастѣйшій. Изъ числа ста человѣкъ зараженныхъ 99 имѣютъ заразу по сей одной причинъ.

- 4) Прикосновентемъ къ заразительному яду, особливо когда касающаяся часть есть ранена, или токмо тонкою кожицею покрыта. Примъры доказывають, что зараза сообщена была поцалуемъ, рюмкою, платьемъ, постелью, лежаньемъ на одной кроватъ, осязантемъ, ланцетомъ, банками, рожками, и проч.
- 9. Ръдкое есть свойство и расположенте таковых в людей, кои сими четырьмя способами не заражаются.

Часть сперьва заразъ коснувшаяся, съ начала заражается. Однакожъ иногда, хотя и весьма ръдко, примъчено, что зараза не сперва заражаеть коснувшуюся часть, но оною токмо всасывается, и немедлънно ко другой тълесной части преходить.

Первъйшее въ зараженной части дъйствіе заразы есть сіе:

- 1) Раздражение твердых в частей; от чего медльнное воспаление и стечение скопляющихся мокротв слъдуеть.
- 2) Премънение соковъ въ гнойную влагу; отъ чего въ зараженной части бывають течение тнойной влаги или скопление оной.
- 5) Язвы сальныя напоследокЪ открываются.
- 10. Зараза, от части сперва зараженной всосана будучи, напослъдокъ производить въ другой части, а иногда и во всемъ тълъ болъзни

бользни, первоначальному дъйствію подобныя, и между собою различествующія однимь токмо различіємь зараженных частей.

- 11. По сей причинъ найлучшее любосшрасшной заразы раздъление бышь можешь сие:
 - 1) На мѣстную заразу, которая токмо одну часть объемлеть.
 - 2) На повсюдную или всемъстную заразу, ко- торая повреждаеть все тъло.
 - 3. На скрышную или пошаенную заразу, кошорая подъ видомъ другой бользни въ шьль скрываешся.
 - 4) На сложенную или смъщенную, которая съ инною бользнію сопряженна бываеть.
- 12. Врачевание любострасшной бользни требуеть.
 - 1) Истребленія любострастной заразы.
 - 2) Возобновленія швердых в и жидких в частей заразою испорченных в.
- 13. Великое есть множество лъкарствъ, коихъ врачебная сила похваляется для истребленія любострастной заразы; но какъ съ теченіемъ времени сій лъкарства не соотвътствовали той похвалъ, которую имъ приписывали: то въ разсужденій сего оныя и преданы уже забвенію, либо токмо употреблялися такъ, какъ средства, ни вреда,

ни пользы неприносящія. Изь числа оныхь дъйствительнъйшими почитаются сіи: бак-кауть, сассафрась, корень сарсапарели, песочной осоки, лапушника и чуващинской, корка корня волчьяго перца, стебельки песьяго грозда, лобелія, сурьма, дикій аврань и опіумь или сонное зълье.

14. Однакожъ безчисленные опышы насъ научають, что ртуть есть единое найлучшее и надежнъйшее лъкарство, любострастному яду противудъйствующее, и оной совсъмъ истребляющее.

15. Спесобъ же давать ртуть вообще есть двоякій; ибо оная либо внъ, либо внутрь предписывается.

- 1) Внѣ употребляется а) во ртутной мази; b) въ дыму киновари; с) въ промывательномъ состоящемъ изъ водянаго раствора ѣдкой ртути или сулемы.
- 2) Внутрь предписывается, а) одна ртуть, b) смъщенная, с) пртуготовленная искусствомъ.

Каждый из сих способов бывает больше или меньше дъйствительным , опасным и и трудным .

16. Смазываніе или треніе ртутною мазью раздъляется:

- 1) На слинопроизводное, когда оная мазь ежедневно наширается въ толикомъ количествъ, что от того причиняется слинотечение, и по продолжении наширания чрезъ 6 или 8 недѣль терпѣливо переносится.
- 2) На угасительное, когда по выдержаніи 30 парных Б бань или ванн В, по очищени первыхЪ пищепріемныхЪ стезей, по употребленіи доброй пищи и пишья кровочистительнаго, чрезъ долгое время употребляемаго, ршушной мази гранЪ 20 либо и больше чрезЪ 2 или 3 дни наширающся. Количество мази, если надобность востребуеть, бережно умножать должно. КогдажЪ знаки слинотеченія окажутся, тогда надлежить сіе треніе оставить, и внутренно дать легкое проносное. Найспособнъйшія кЪ таковому натиранію сушь внушренныя поверхносши верхнихЪ и нижнихЪ удовЪ, паховЪ и лядвій. Напираніе всегда при огнъ самымЪ больнымЪ чинимо бышь должно.
- 17. Способъ слинопроизводный бываетъ 1) многотруднымь, по причинъ тяжелаго задоха и другихъ прежестокихъ припадковъ; 2) крайне ненадежнымь и бездъйственнымь, по причинъ чрезмърно скораго испаренія ртути изъ тъла; 3) весьма опаснымъ, по причинь шойже ртупи засьдающей въ разныхъ шѣле-

тълесных в частях в; и на послъдок в 4) не нужным в, по тому что любострастная бользны может в совершенно быть уврачеванна без в слинотечентя, как в то опыты нам в доказывают в.

- 18. Способъ угасительный едва есть лучше перьваго, по причинъ опасности происходящей от засъдающей ртути, медлъннаго льченія и слинотеченія трудно отвращаемаго.
- 19. Дымъ киновари, по причинъ опасенія ошь задоха и ръдко ошвращаемаго слиношеченія вовсе осшавишь должно.
- 20. Промыващельное состоящее из водянаго раствора сулемы есть весьма опасно; по причинъ неизвъстнаго количества всосаннаго яда.
- 21. Ртуть одна, то есть живая, в большемь количествы поглощаемая, от кишекь не всасывается, но большею частью снова низомы испражняется; а по сему и врачевание бываеть безполезное и ненадежное.
- 22. Ршушь смъшенна бышь можешь съ раз-
 - 1) СЪ раковыми жерновками, и называется Ал-
 - 2) СЪ сахаромЪ, и называется сахарною.

- 3) СЪ строю, и называется Евїопомъ Чернымъ.
- 4) СЪ манною, медомЪ сырымЪ, или ревенемЪ; и называется ртупью манновою, медовою, ревеневою.

Всъ сїи смъщенныя средства легко оставляють ртупь вы перьвых в стезях в; слъдственно малое количество сего полуметалла входить вы самую кровь; а по тому и врачеваніе оть оных весьма медлительное и ненадежное.

- 23. Ршушь искусствомь пріуготовляется:
- 1) СЪ купоросною кислотою, какЪ то турпетъ минеральный.
- 2) СЪ сольною кислошою, какЪ шо сулема и сладкая ршушь.
- 3) СЪ селитреною кислотою, какЪ то, осаженная красная ртуть.
- 4) СЪ уксусною кислошою, какЪ шо, каршейзеровЪ горошникЪ или кашышки.
- 5) СЪ кислотою виннаго камня, какЪ то вода прозябаемо-ртутьная.
- 6) Долговременною перегонкою пережженная, какЪ то ртупь сама чрезъ себя пережженная.

Всъ сїи ршутьные составы, будучи внутренно въ большемъ количествъ и чрезъ долтое время употребляемы, суть весьма опасны, производять прежестокое слинотеченіе, ръзь и боль въ животь, изсушение тьла, кровоплеванье, чахотку и проч; а въ меньшемъ количествъ будучи предписываемые, дъйствують весьма медлънно, и токмо предвохраняють, а несовершенно врачують бользнь, какъ въ томъ меня многочисленные опыты научили.

24. Ртуть камедьная состоящая избодной части живой ртути и трехъ частей Аравійской камеди, посредствомъ цыхорейнато и ревеневаго сиропа растертыхъ въ клей, внутрь употребляется въ видъ пилюль, сиропа или микстуры, въ такомъ количествъ, чтобъ по утру и въ вечеру 10 гранъ камедьной ртути принимаемы были.

Сїя ртуть 1) бываеть непротивна ни занахомь, ни вкусомь, какъ прочїе искусствомь пріуготовленные составы. 2) Легко входить во вторыя стези, и проницаеть во вст сосуды. 4) Весьма ртдко причиняеть слинотеченїе. 4) Не низлагается мъстно, какъ ртуть съ какимь нїесть жиромь растертая обыкновенно въ разныхъ частяхъ застаеть; по тому что клейкая Аравійская камедь ни когда не отстаеть оть ртути въ жидкой влагь. 5) Не можеть вредить ядовитою остротою, по примъру ртутьныхъ соляныхъ составовь. 6) Всьмы людямы даже и младенщамы, беременнымы, изсохшимы и слабосильнымы оную давашь можно; чего о ртутьной мази и соляныхы составахы сказать не льзя. 7) Напосльдокы по опышамы моимы она врачуеты всь любострастныя бользни, ртутью льчимыя; да и то скажу, что я многихы больныхы уврачевалы одною камедьною ртутью, коихы прочёе прёуготовленные ртутные составы исцылить не могли. 8) не требуеты скучнаго прёуготовленія бань, ни увольненія оты должностей, ни безпрерывнаго сидынья вы теплой комнать. 9) Не причиняеты убогимы многаго иждивенія.

25. Пріўготовленіе болящаго ко употребленію қамедьной ртути требуеть: 1) кровопусканія, если больный есть многокровень; 2) проносных лькарствь, кои чрезь каждые 10 дней повторить должно, для очищенія перьвых в стезей; 3) питья разводящаго и клейкаго, состоящаго изв корня сарсапарели и репейника, если сложеніе болящаго есть горячее и кръпксе, или изв древа бакаута, если онв есть сложенія холоднаго и слабаго. 4) Здоровой пищи; при чемв все то, что не скоро варится, жирное и кислое оставить должно. 5) Благораствореннаго воздуха; ибо сту-

стужа вредить, а горничная теплота и одежда съ лишкомъ шеплая легко производящъ слиношечение. Въ хорошую поголу болящий должень часто прогуливаться пъшкомь. 6) Если знаки слиношечентя во устах во окажутся; въ такомъ случат должно чрезъ нъсколько дней сряду оставить употребление ртуши и принять проносное. 7) Теплыя бани или ванны вв застарьлой любострасшной бользни, прежде и при употреблении ртути, предписывашь должно; но в бользни недавней можно оныя оставить. 8) Употребленте ртути продолжать должно дотоль, поколь вся любострастная зараза совершенно истреблена будеть. Что познается изъ того, когда любострасшная бользнь болье от ртупи не перемъняется, и болящій почнеть сь трудомь сносишь употребляемую ртушь. Тогда надлежить оставить, и льчить бользнь обыкновенными авкарствами.

26. Средсшво образцовое, которое могло бы совершенно воспрепятствовать слинопро-изводной силъ ртути, еще и понынъ не извъстно. Ни съра, ни канфора, ни лихорадочная корка, ни желъзо, со ртутью употребляемыя, къ тому способствовать не могуть. Однакожъ проносныя, чрезъ каждые

8 дней повторяемыя, такъ же ртуть ежедневно вы маломы количествы употребляемая, взвары клейкія, глава и выя не чрезмырно одеждою согрываемыя, окружность воздуха свободная, и удаленіе оты куренія табаку, препятствують и удерживають слинотеченіе.

отдъление и.

О любострастныхъ бользияхъ подробно.

ГЛАВА I. Обълой грыжѣ.

- І. Бълая грыжа любострастная.
- 1. Бълая любострастная грыжа есть истеченте гнойной бълой слизи изъ мочеиспускательнаго ствола и плъшки.
- 2. Истекающая вы случать былой грыжи влага, не есть настоящее сымя, ниже настоящій гной, но клейкая слизь изы возгривыхы желыты происходящая оты любострастной заразы, и перемынившаяся вы острую желто-зеленоватую мокроту, которая во время плотскаго совокуплентя заражаеты здоровую жену сею бользытю.
- 3. Ближайшая причина бълой грыжи не сспь язва въ мочеиспускашельномъ стволъ обръ-

обръшающаяся; ибо весьма ръдко шаковая язва въ ономъ сшволъ купно съ бълою грыжею находишся; какъ раздробление мершвыхъ шълъ насъ шому научаешъ.

- 4. Ядь бълой грыжи, какъ кажется, не разнится отъ яда или заразы любострастной.
- 5. Знаки, коими бълая грыжа любострастная от нелюбострастной различествують, заимствовать должно от предшедшаго подозрительнаго соитя, от зеленоватаго цвъта и от трудности, при испусканти мочи бывающей; но единый и достовърнъйшти знакъ есть зараза здоровой жены.
- 6. Мѣстопребыванте обыкновенной бѣлой грыжи состоить въ ложжинкахъ мочеиспускательнаго ствола Моргановыхъ.
- 7. Бълая грыжа, въ разсужденти ея свойства, бываеть 1) Простая, недавняя, и безъ всякой другой бользни бывающая. 2) Застарьлая, закореньлая, или долговременная. 3) Смытенная, или съ другою бользно соединенная; таковая, съ малыми язвами дытороднаго мужескаго уда будучи соединена, легко причиняеть заразу; по тому что ядь удобные всасывается оть язвы, чымь безь оной.

 II.

II. Бѣлая грыжа простая.

8. спустя нъсколько дней послъ бывшаго нечистаго соитія, ръдко по прошествій нъскольких в недъль, раждается ненепріятное щекошанье в плъшкъ и мочеиспуска шельном в співоль дътороднаго уда мужескаго. Устье плышки пухнешь, равешь, горишь и зілешь; вь самомбусть в моченспускательнаго ствола немножко тонкаго гноя усматривается. По томъ спустя немного времени, ощущается жигучая и жестокая боль, при испускании мочи, а особливо при окончании, такъ что кажется будьто бы иглами колеть. При чемь въ довольномъ количествъ изъ мочеиспускательнаго ствола каплями истекаеть слизь желпо-зеленовашая, иногда съ кровяными волоконцами смъщенная; въ тожъ самое время весь мочеиспускательный стволь, даже до самой шейки мочеваго пузыря, напрягается. При концъ вся боль и припадки вожженія мало по малу умаляющся, моча едва жжеть, и слизь исшекающая бываеть бъловатье равнообразнъе.

На последокъ при испусканти мочи боль отнюдь не ощущается, слизь белая, клей-кая, на подобте нити изъ мочеиспускательнато ствола истекаеть; мало по малу количество

чество оной слизи умаляется такв, что токмо несколько капель чрезв целой день или ночью, оттуда выжать можно, а по томв и сте совершенно перестаеть.

- 9. Опісюда явствуеть, что все теченіе сея бользни можешь раздълено бышь на чешыре времени: 1) На время заразы, начинающейся от бывшаго нечистаго соишія, даже до начала трудности бывающей при испусканіи мочи, и продолжающееся по большой часши чрезв нъсколько дней, а иногда и гораздо долье. 2) На время воспаленія, кошорое познаешся по воспалишельной боли, лихорадкъ и трудности при испускании мочи бывающей, и мучить болящаго чрезь одну или двъ недъли. 3). На время исшечения, которое познается шъмъ, что трудность при испускании мочи не бываеть, и обыкновенно продолжается чрезъ нъсколько недъль. 4) На время теченія слизи, которое познается по истеченію слизи немногой и безцвътной.
- ваеть различное, взглядомь различія времени.
 - 1) Время воспаленія пребуеть: а) Кровопусканія, если боль и вожженіе дѣтороднаго уда суть жестокія; въ противномъ же случаѣ оно не нужно. b) взвара смягчительнаго и при томъ

томъ воспаленію сопрошивляющагося. Такой взваръ можно пртуготовлять изъ корней сарсапарели, просвирокЪ, перечищеннаго виннаго камня, селипры и сиропа маковых выповы и сѣменъ. или с) Оршада, т. е. молока прохладительнаго, пртуготовленнаго изъ съменъ огуречных или миндалей, совокупно съ селитрою и сиропомь былаго маку. Таковое пишье вЪ великомъ келичествъ употреблять, и дотоль продолжать должно, поколь боль при испусканіи мочи ощущается. d) Порошка слабительнаго состоящаго изъ пріуготовленнихъ раковинъ или черепашекъ, ревеня и горькой соли; котораго по полузолошнику трижды вЪ день принимать должно. е) Питанія тонкаго ои прошивувоспалительнаго. При чемъ винограднаго вина, соишія, верховой фады, и ночнаго испражненія съмени беречься должно. f) ВЪ течени сего времени весьма вредятъ кръпкія смолистыя, острыя, бальсамическія, какЪ то: Копайскій бальсамЪ, терпентинЪ, сърный бальсамЪ, острая тинктура сурьмовая, и вяжущія вспрыскиванія; по тому что либо умножають воспаление, либо прекращають бѣлую грыжу сЪ превеликою опасносшью.

2) Время гноешеченія пребуеть: а) порошка слабительнаго смішеннаго сь нісколкими каплями Копайскаго бальсама, b) питья кровочистительнаго сострящаго изь корня лапу-

абоне Орті буртская области я библиотека им. Н. К. Крупской шника. с) вспрыскиванья ртутнаго, состоящаго изъ ползолотника сладкой ртути, одного унца аравїйской камеди, и одного фунта перегнанной воды. Такое вспрыскиванье трижды въ день повторять должно.

3) Время слизотеченія требуеть лькарствь крыпительных внутренних состоящих из лихорадочной корки, стали, корицы и ртутнаго вспрыскиванья.

III. БЕлая грыжа плешки.

ти Бѣлая грыжа плъшки есшь истечение тнойной слизи изъ скважинокъ плъшки испразднительныхъ. Врачевание въ течени воспалительнаго времени, есть то же, что и въ бълой грыжъ мочеиспускательного ствола; а въ продолжени времени гностечения вмъсто ртупьнаго вспрыскиванья должно парить дътородной удъ въ ртупьномъ растворъ.

IV. Бѣлая грыжа застарѣлая.

12. Бѣлая грыжа застарѣлая или закоренѣлая есть истечене гноеватой слизи,
отб многихб мѣсяцей или лѣтб продолжающаяся. Причина сего вида болѣзни есть либо
язва застарѣлая въ мочеиспускательномъ стволѣ, либо без лѣйственность и разслаблене
протоковъ испразднительныхъ мочеиспускательнаго ствола. Виды оной.

1) Бѣлая грыжа застарѣлая слизоточная, отъ Агличанъ глитомъ называемая, познается по истеченію тонкой слизи, и по неощущенію мѣстной боли въ мочеиспускательномъ стволь. Причины ея суть сій: частое соитіе во время бѣлой грыжи, балсамическія лѣкарства съ лишкомъ долго употребляемыя, и природное либо отъ старости, либо отъ инной болѣзни причиненное разслабленіе и бездѣйственность ложжинокъ слизоточныхъ.

Врачеваніе требуеть лікарствь кріпительныхь внутреннихь и внішнихь, какь то вспрыскиванья купоросного, полосканья дітороднаго уда вы холодной воді, кріпительнаго вина настояннаго сы лихорадочною и винтеровою корками, желізными опилками и горькими травами.

2) Бѣлая грыжа застарѣлая язвенная познается по гноеватой сукровицѣ истекающей изъ дѣтороднаго уда, и по мѣстной боли, въ какой нёсть части мочеиспускательнаго ствола ощущаемой при испусканіи мочи, при запусканій свѣчь, или во время здавливанія дѣтороднаго уда перстами.

Врачеваніе требуеть 1) внутренняго употребленія камединной ртути, 2) запусканія свічи смазанной меркуріальнымь бальсамомь, и 3) вспрыскиванья ртутнаго раствора смішеннаго сь соннымь зільемь.

TAABA BTOPAA.

О тру жномъ мотететении мовострастномъ.

- 1. Трудное мочешеченте любосшрастное есть испусканте мочи жигучее и чувсшвительную боль причиняющее, отв любострастной заразы происходящее.
- 2. Виды сея болъзни суть сїи:
- 1) Трудное мочетечение воспалительное. Оно раждается от воспаления мочеиспускательнаго ствола, и причиняеть весьма ощутительный жарь при испускании мочи бывающий, безь всякаго истечения гнойной слизи изы мочеиспускательнаго ствола. По сей причинь и на которые писатели называють оное сухою грыжею.
- Врачеваніе требуеть, 1) Кровопусканія. 2) Оршада или молока прохлаждающаго. 3) взвара смягчительнаго корня проскурняка или наливка льняныхь сфмень. 4) проноснаго сопротивляющагося воспаленію. 5) Пилюль состоящихь изь камединной ртути. 6) Омовенія дфтороднаго уда вы парномы молокь съ камединною ртутью соединеннаго; и 7) Вспрыскиванья масла и ртутьнаго млека.
- 2) Трудное мочетение бѣлогрыжное. Оно есть припадкомъ недавней бѣлой грыжи. Сие дока- зывается тѣмъ, что страждущие многократно бывшими бѣлыми грыжами въ началѣ бѣлой

трыжи отнюдь не страждуть труднымь мочеиспусканіемь, или едва оное слегка чувствують; однакожь иногда оно приключается посль ядовитой былой грыжи прекратившейся оть употребленія вяжущихь лыкарствь. Боль утоляется, или по меньшей мыры послабляеть, какы скоро былая грыжа снова течь начинаеть.

Врачеваніе бываеть то же, какь и вы первомы видь. При чемь должно беречься того, дабы былая грыжа прекратившаяся, разгорячительными лыкарствами возобновляема не была.

- 3) Трудное мочешечение язвенное. Оно у мущинь от язвы мочеиспускательнаго ствола, а у жень от язвы устья онатожь ствола раждается. Сей видь бользни долго продолжается; и познается по мьстной боли: а о льчени онаго зри язвы мочеиспускательнаго ствола.
- 4) Трудное мочешечение женское. Оно есть припадкомъ течения бъли, сопряженной съ воспалениемъ мочеиспускательнаго ствола; ибо простое течение бъли едва ли и въ самомъ своемъ началъ имъетъ сопряженное съ нимъ трудное мочетечение. Врачуется тъмъ же образомъ что и трудное мочетечение мужеское.

cay and apologenie at

IAABA TPETBA.

О могеза держаніи любострастномв.

1. Мочезадержаніе любострастное есть запорь мочи, трудность или невозможность мочиться, такь, что моча либо на подобіе нити одинакой либо двоераздъльной истекаеть, или токмо каплями сь превеликою натугою выжимается.

Виды сего бользненнаго припадка сушь слъдующіе.

2. Мочезадержанте воспалительное есть вожженте мочеиспускательнаго ствола, или предстательной жельзы, иногда въ самомъ началь бълой грыжи, или ото той же бълой грыжи чрезъ вспрыскиванье прекратившейся, возрастаеть до толикой степени, что путь мочи либо совсъмъ заграждается, либо оная дълается многотрудною.

Сей видь бользни обыкновенно оть мочевых выпускниковь или от употреблентя свычь весьма ожесточается. Лыченте оной требуеть средствы тыхы же, коими и трудное воспалительное мочетеченте врачуется. О чемы зри выште. Когдажы путь мочи онымы способомы вскоры не очищается, вы такомы случаь прободенте мочеваго пузыря учинишь, и врачевание прошивувоспалишельное продолжашь должно.

3. Мочезадержание от затвердълости предстательной жельзы. Оно познается по холодной опухоли сокращающей начало мочеиспускательнаго ствола. Перстомъ възалній проходь запущеннымь найлучше оная опухоль жельзы ощущается.

Врачевание онаго припадка требуеть внупренняго употребленія камединной ртупи купно сь аммонїакальною камедью, пакь же красавищею, дикимъ авраномъ и прочими разводящими лъкарствами.

Внъ должно къ промежности срамнопроходной прикладывань ршутьную мазь съ мужескимъ корнемъ, mandragora, въ молокъ свареннымъ. Зри о семъ затвердълую окръплость предстательной жельзы.

4. Мочезадержание от узловатой опухоли пещеристаго вещества мочеиспускательнаго ствола. Сте вещество, въ разныхъ мъстахъ отъ мъсшной недъйсшвишельносши плъвы ограждающей внутреннюю поверхность мочеиспускательнаго ствола, обыкновенно выпучивается въ самую впадину онаго. Распознается же тъмъ, когда посредствомъ мочеваго выпускника ощущается гладкое и мягкое препятсшвіе ствіе. Врачеваніе требуеть употребленія свічь.

- 5. Мочезадержаніе от опухоли или наростшаго бугорка какой ніесть большой жельзы. Сій опухоли иногда бывають ноздреватыя, а иногда мозолистыя и зашвердьлыя.
- 6. Мочезадержаніе от мозолистых и вспухших в язвы моченспускательнаго ствола, познается по теченію гноя или сукровицы изы онаго ствола.

Врачевание требуеть свычь ртушьныхь, бальсамомь смазанныхь.

- 7. Мочезадержаніе от рубчиков оставшихся посль бывших в язвы вы моченстускательномы стволь; кои составляють мозолистыя протяженія сокращающія впадину онаго ствола; распознаются мочевымы выпускникомы, и врачуются свычами.
- 8. Мочезадержаніе плънчатое, или отв мясистой и мягкой бородавки, внутрь мочеиспускательнаго ствола, послъ бывших в вы немы язвы оставшейся или возродившейся, познается по мягкому препятствію ощущаемому посредствомы мочеваго выпускника, и по мочи истекающей двоераздыльною струею. Однакожы весьма рыдко плыка или бо-

родавка

родавка бываеть причиною мочезадержанія любострастнаго.

Брачеваніе пребуеть свічь.

- 9. Мочезадержаніе ошь самороднаго сокращенія или сожашія мочеиспускашельнаго ствола, познается по тонкой струи истекающей мочи, и по запущенію свычи, которою мочеиспускательный стволь либо везды, либо токмо вы ныкоторыхы мыстахы сокращеннымы ощущается Сей виды легчы всыхы другихы врачуєтся свычами.
- 10. Мочезадержаніе любострастное стариковь. Люди имъвшіе во своихь младыхь аттахь частую бълую грыжу, не ръдко по прошествій 50 льть страждуть трудноватымь мочетеченіемь, которое иногда продолжается чрезь многіе годы сряду, а часто превращается и вы мочезадержаніе.

Членораздробленіе шѣль умершихь сь таковымь мочезадержаніемь, показывають намь воспаленіе и сожатіе мочеиспускательнаго ствола, а не плъшки и не бородавки, какь нъкоторые думали.

Приматание. Всъ спи виды мочезадержания имъющь свое начало ошь преждебывшихь и худо врачеванныхь, или себъ безь всякаго лъчения оставленныхь бълыхь грыжь, либо оть Б 5 язвъ

язвъ мочеиспускательнаго ствола. Однакожъ весьма трудно чрезъ испытанте мочеваго выпускника, или свъчами, исправно распознавашь различие причинь. Въ прочемъ врачевание оныхъ едва различествуеть, и требуеть вообще і) внутренняго употребленія камединной ртути и взвара сарсапарели; ибо сими лъкарсивами любострастная зараза отвращается; 2) нарной или теплой и смягчительной купъли, коею мочеиспускательный стволь смягчается, а чрезъ то и свъчи тула лучше запускаются; 3) употреблентя свічь, коими сожащие мочеиспускащельнаго ствола разширяется. Свъчи сперьва тонкія, а по томЪ мало по малу пополщъ запускать нужно. Таковыя свычи вскоры послы употребления купъли весьма легко внутрь ствола вкладываюшся.

TAABA YETBEPTAR.

О лупырышках в кристаллови дных в любостра-

1. Пупырышки кристалловидные любострастные суть пузырки прозрачные, на подобіе крысталлов в лоснящіеся, величиною горчичному съмени равные, на плъшкъ или кожицъ, плъшку покрывающей, случающіеся.

- 2. Они по большей части по прошестви немногих дней превращаются вы малыя язвы, шанкромы называемыя.
- 3. Врачеваніе совершается внутреннимь употребленіемь камединной ртути, и внішнимь омовеніемь состоящимь изв раствора сладкой или мореной ртути.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

0 бугорках в любострастных в Автороднаго уда.

- 1. Бугорки любострастные, на дътородномъ мужескомъ удъ нарастающіе бывають величиною съ горошинку, а иногда и побольше.
- 2. Они раздъляются въ разсуждении мъста, которое занимають, на
- 1) Бугорки плъшки, кои около уздочки въ самомъ существъ плъшки въ Моргановыхъ желъзкахъ, либо около, и надъ плъшкою въ душистыхъ желъзахъ имъютъ свое съдалище.
- 2) Бугорки крайней плоти, въ самомъ покровъ, плъшку ограждающемъ, гиъздящиеся.
- 3) Бугорки Ковперовой жельзы, надь самою луковицею мочеиспускательнаго ствола, и около раздъленія пещеристыхь тьль мочеиспускательнаго ствола обрътающіеся.

- 4) Бугорки прочихъ жельзъ, по разнымъ мъсшамъ дъпороднаго уда являющиеся.
- 6. Всъ оные бугорки, въ разсужденти своего свойства, бывають либо жаркте, либо хладные.
 - 1) Жаркіе познающся по краскѣ, боли и испусканіи клейкой и бѣлой слизи, особливо если перстами здавлены бывають. Они иногда превращаются въ глубокія язвы.

Врачевание оныхъ требуеть разогнания чинимаго посредствомъ ртути внутрь и внъ употребляемой.

2) Хладные познаются по твердости и небытіи воспаленія; врачуются же равно какЪ и жаркіе бугорки.

IAABA WECTAR.

О язвах в любострастных в ллышки.

- 1. Язвы любострастныя плешки разъедають всю плешку или внутреннюю поверхность крайней плоти; оть Французовь называются шанкромь.
- 2. Язвы млечныя молочным подобныя. Онъ раждающся от предшедших крысталловидных пузырьков, лежат на самой поверхности; и раствором ртупным бальсамическим, нъсколько раз в сутки будучи смываемыя, легко врачующся.

3. Язвы обыкновенныя, бывають полукруглыя, вь окружносши красноватыя, по срединь пъсочныя, оть молочничныхь ширь и поглубже.

Врачеваніе требуеть внутреннято камединной ртути употребленія; а вит должно прикладывать ртутьной бальсамь, или бальсанической растворь.

4. Язвы въ шанкръ премъняющіяся. Онъ весьма великую боль причиняють, край имъють разътденные и сосковатые, и разътдають всю плъшку. Зри шанкръ дътороднаго уда мужескаго.

5. Язвы внешнія детороднаго уда мужескаго, вышше, ниже или по бокамь деторо/наго уда мужескаго, какь мне несколько разь видеть довелось, случаются.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О шанкрв любострастномо двтороднаго уда мужескаго.

т. Шанкръ любострастный есть не что иное какъ превращение плъшки или крайней плоши въ рака.

Весьма худый способь есть тоть, когда малую язву на плыкь случающуюся, яко ядь истребляють, ежедневно по нысколько разъ

разъ прикасаяся оной ъдкимъ адскимъ камнемъ или синимъ купоросомъ; ибо ошъ шого часто любострастная простая язва плъшки превращается въ рака весьма опаснаго.

2. Ракъ дътороднаго уда, взглядомъ своего свойства бываетъ двоякій:

1) Ракъ обыкновенный есть гніючая язва разъъдающая крайнюю плоть и плешку съ превеликою и безпрерывною болью, и бывающая сосковатою и кровоточащею.

Врачуется камединною ртутью, съ соннымъ зъльемъ внутренно, и бальсамическимъ растворомъ наружно употребляемыми. Когдажъ сти лъкарства никакой пользы не приносять, тогда надлежить искусствомъ отдълить дътородной удъ; но и отсъченте онаго не пользуетъ, когда паховыя жельзы въ тожъ самое время отъ рака заражены и затвердълы находятся, какъ то мнъ видъть случалось.

2) Ракъ ноздревашый. Крайняя плошь, или только плешка, либо и та и другій превращаются въ опухоль превеликую, ноздреватую, иногда кровавую, величиною съ голову. Сїє случаєтся отъ язвъ плешки, худо лечимыхъ.

Врачеваніе требуеть отнятія дѣтороднаго уда; что найлучше и безопаснѣе при концѣ таковой опухоли, посредствомь перевязки совершается.

TAABA

TAABA BOCKMAN.

О язвах в любострастных в мосепслускатель-

- 1. Любострастныя язвы мочеиспускательнаго ствола бывають либо на внутренной поверхности онаго, либо изь другихь частей приносящія ядь вы самую его впадину.
- 2. Язва мочеиспускательнаго ствола простая познается по долговременной бълой грыжь, по мъстной боли и жару, въ особливой и одной части онаго ствола ощущаемымь, а особливо при испусканти мочи, такъ же чрезъ внъшнее прикосновенте, и во время запускантя свъчь.
- 3. Язва предстательной желѣзы познается по преждебывшему нарыву въ сей желѣзѣ, и по воспослѣдовавшему отверстію онаго нарыва внутрь мочеиспускательнаго ствола. Зри нарывъ предстательной желѣзы.
 - 4. Язва съменнаго пузыръка познается по преждебывшему воспаленію и возгноенію сего жъ пузырька, такъ же и по истеченію съмени изъ ствола.
 - 5. Язва какой ніесть большой жельзы. Познается по преждебывшему бугорку жар-кому и глубокому, на дътородномь удъ, возгноенномь, и открывшемся въ самой стволь.

Иногда

Иногда таковыя язвы, какъмнъ видъть случалось, открываются даже на внъшней поверхности дътороднаго уда, и изъ себя испускають мочу.

6. Врачеваніе язвъ въ самомъ стволѣ сокрывающихся, либо во оной зіяющихъ, кромѣ внутренняго употребленія камединной ртути съ соннымъ зъльемъ пріуготовленной, требуеть еще и запусканія свъчь ртутьнымъ бальсамомъ смазанныхъ.

INABA AEBATAA

О незалупт любострастной.

- 1. Незалупа любосшрасшная есть опухоль крайней плоши, препяшствующая обнаженію плъшки.
- 2. Незалупа воспалительная имъетъ свое начало отъ любострастнаго воспалентя крайней плоти.

Сіе воспаленіе рѣдко одинакое, по большей части съ язвами и опухольми плѣшки и крайней плоти, или съ бѣлою грыжею, сопряжено бываеть.

Врачеваніе онаго, кромѣ кровопусканія и прочихь внутренныхь, воспаленію сопротивляющихся лькарствь, требуеть еще и пилюль состоящихь изь камединной ртути,

и внъшней купъли или омовенія для дътороднаго уда состоящаго изб ртутьнаго млека или изб водянаго раствора ртути.

Весьма рѣдко требуется разрѣзаніе крайней плоти, да и надлежить сїе дѣлать весьма искусно. Я многократно примѣтиль, что единое омовеніе дѣтородного уда парнымь млекомь, или водою прозябаемо минеральною, и смазываніе онаго неаполитанскою мазью не принесли ни какой пользы.

3. Незалупа крысталловидная есть опухоль прозрачная, лоснящаяся, отобку подобная, пасокою наполненная, на крайней плоти случающаяся.

Врачеваніе оной сверх внутренняго употребленія проносных в и камединной ртути, требуеть еще и омовенія состоящаго из водянаго ртутьнаго раствора, сь водкою смътеннаго.

4. Незалупа окрѣплая и затвердѣлая есть затвердѣлость крайней плоти, большею частою бугорьковатая. Здѣсь приличествують внутренно камединная ртуть купно съ прочими разводящими и разбивающими; а внѣ воляный ртутьный растворъ пртуготовленный со смягчительными.

- 5. Незалупа ракомъ пораженная, когда вся крайняя плоть превращается въ превеликаго ноздреватаго рака. Зри ракъ дътородного уда.
- 6. Незалупа антоновым отнем пораженная. Иногда от вакаго любострастнато яда, а большею частью от худаго врачеванія, при воспаленіи употребляемаго, раждается антонов отонь на крайней плоти. Врачеваніе требуеть внутренних и внътних тнилости сопротивляющихся, коими помертвълое от здороваго легко от дъляется.

TAABA AECATAA.

О залуль незалулной любострастной.

- 1. Залупа незалупная любосшрастная есть воспаление плъшки любострастное, которое толико задерживаеть или сожимаеть крайнюю плоть, что оная на подобие петли плъшку здавливаеть и назадь заворачивается.
- 2. Сей бользненный припадокъ крайне должно различать от залупы незалупной нелюбострастной, которая от сильнаго заворочения крайней плоти при плотскомъ со-ити иногда случается.
- з. Виды залупы незалупной любострастной сущь сїи:

- 1) Залупа незалупная любострастная воспалительная; по большой части съ язвами или шишками плъшки сопряжена бываеть. Она требуеть, кромъ кровопускантя и внутренняго камединной ртути употреблентя, еще и омовентя дътороднаго уда, состоящаго изъ ртутьнаго раствора; а при томъ, если возможно и того, чтобъ крайнюю плоть внизъ спустить.
- 2) Залупа незалупная, в антонов огонь превращающаяся, есть та, когда антонов огонь настоить; который означается синевом платики. В таковом случав, крайнюю плоть назадь завороченную посредством боковых насъчений разширить и наперед притянуть должно.

Антоновь огонь плышки требуеть внутренняго и внышняго употребленія лькарствь, гнилости сопротивляющихся. Рыдко антоновь огонь далые плышки простирается; слыдственно и отнятіе оной не нужно, какь то мны видыть случалось.

TAABA OAUHATUATAR.

О напряжений детороднаго уда любострастномь.

т. Напряжение дътороднаго уда мужескато есть неприятное, непохотливое и долго-В 2 вревременно продолжающееся плоши востаніе или вздрачиваніе.

- 2. Виды онаго сушь сїи.
- 1) Напряженіе дітороднаго уда білогрыжное раждается от воспаленія мочеиспускательнаго ствола, слідственно бываеть припадком труднаго мочетеченія и воспалительной білой грыжи.

Врачеваніе требуеть камединной ртути и лькарствь воспаленію сопротивляющихся. Зри трудное мочетеченіе воспалительное.

2) Напряженіе дѣтороднаго уда долговременное. Я видѣль юношу, который чрезь цѣлыя шесть недѣль, послѣ бѣлой грыжи вяжущими лѣкарствами прекращенной, страдаль напряженіемь дѣтороднаго уда, безь всякой другой любострастной болѣзни. Онь вылѣчился чрезь внутреннее камединной ртупи употребленіе и теплымь омываніемь дѣтороднаго уда, состоящимь изь водянаго ртутьнаго раствора, и ртутьною мазью, коею болящій удь быль смазывань.

TAABA ABEHAAU, ATAA.

О лохоти любострастной.

1. Похоть любострастная есть превеликое желаніе ко плотскому соинію, съ похотливымь востаніемь плоти, а часто и съ посльдующимь истеченіемь съмени.
2.

- 2. Похоть любострастная от нечистаго соитя. Она примъчается въ то время бълой грыжи, которое бываеть между заражентемь и начинающимся бълогрыжнымь воспалентемь. Слъдственно она есть знакомь заразы и предвъщантемь бълой грыжи.
- 3. Она раждается от раздражентя чувственных в жиль, вы мочеиспускательномы стволь раздыляющихся, привлекающаго и съменные пузырьки вы сочувствте.
- 4. Врачевание сего припадка требуеть впрыскиванья ртупьнаго въ мочеиспускательной стволь; симъ образомъ, какъ я самъ примътилъ, иногда бълая грыжа отвращается.

IAABA TPUHAAUATAR.

О корст любострастной датороднаго уда.

- 1. Корча любострастная дътороднаго уда есть накрывление напряженной плоти, иногда въ низъ, а иногда на бокъ.
- 2. Корча дътородного уда бълогрыжная. Когда уздочка крайней плоти воспаляется, въ такомъ случат дътородный удъ, во время бълой грыжи воспалительной, при самомъ вздрачиванти сильно извивается и накривляется. Писатели бълую грыжу, съ таковою

корчею сопряженную называють бълою гры-жею тепивною.

Врачеваніе требуеть лъкарствь противувоспалительных в съ камединною ртутью. Зри трудное мочетеченіе.

5. Корча дътороднаго уда от бугорьковъ или бородавокъ. От бълой грижи многократно бывшей иногда железы окръплыя или узлы пещеристаго существа въ мочеиспускательномъ стволъ остаются, и причиняють оную корчу.

Корча всегда примъчается оборочена въ ту сторону, которая есть прошивуположенна узлу. Такимъ образомъ узель въ правой сторонъ, на лъво: въ лъвой направо: въ нижней въ верхъ, а въ верхней въ низъ, накривляетъ дътородный удъ. Таковые узлы причиняютъ затруднение и истечению мочи и испражнению съмени.

Врачеваніе сея корчи требуеть отнятія узла, бугорька, или бородавки; что однакожь вь дёйство произвести весьма трудно. Лучше стараться о томь, чтобь таковые узлы разогнать или привести вь нагноеніе.

4. Корча дътороднаго уда от недостатка клътчетой съти, которая въ нъкоторыхъ рых возгноенія разрушилась.

Врачевание едва ли есть возможное.

ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

О невстаних в мужеской любострастной.

- 1. Невстаниха мужеская любострастная есть безплоднаго съмени истечение, или невозможное выбрашивание.
 - 2. Виды оной бывають следующе:
- 1) Невстаниха от повсемственной заразы. Когда съмя купно от любострастнаго яда есть испорчено, тогда оное послужить къ распространенію заразь, а не ко произведенію дътей.

Врачевание требуеть камединной ртупи.

- 2) Невстаниха от съменных пузырьков сожатых или скорченных в. Таковая порча съменных пузырьков иногда была найдена въ мертвых тълах послъ предшедших любострастных болъзней.
- з) Невстаниха от сростинхся устьевь протоковь выбрасывающихь: и сія корча равно какь и перьвая найдена вы мертвыхь тылахь любострастныхь. Объ сій корчи вы живущемь человъкъ познать не льзя, и объ суть неизлючимыя.

отдъление III.

О бользняхь съменныхь яичекь. ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О вослалении любострастномъ янтекъ.

- 1. Любострастное воспаление яичекъ есть опухоль жаркая и болъзненная одного только или обоихъ яичекъ.
- 2. Воспаленіе яичекъ бѣлогрыжное. Оное раждаешся во время воспалишельное бѣлой грыжи, от сочувствія мочеиспускательнато ствола съ яичками, и само собою проходить, по утоленіи воспаленія въ мочеиспускательномь стволь.

Врачеванте онаго пребуеть противувоспалительных вътарствь, коими вожженте яичекъ утоляется; вспухштя яички повязкою мощенки въ верхъ приподнимать должно.

3. Воспаленіе яичекъ отъ мъстнаго поврежденія. Часто одно или оба яичка воспаляются отъ скоро прекратившейся или мало точащей бълой грыжи, и отъ изсохшей язвы плъшки.

Врачеваніе требуеть, 1) пилюль состоящихь изь камединной ртути, коими теченіе былой грыжи часто возобновляется и ядь истребляется; 2) оршада или молока прожладихладишельнаго и проноснаго прошивувоспалишельнаго; 3) шеплой припарки состоящей изъ смягчишельной муки въ водъ разваренной, коею бель и воспаленте утоляются; 4) повязки мошеночной, коею яички вспухште въ верхъ приподнимаются.

4. Воспаленіе загноившееся. Яичко возгноившееся познаешся по тому, когда послѣ предшедшаго въ ономъ воспаленія ощущается колебаніе гноя въ одномъ или въ многихъ мъстахъ мошенки. Врачеваніе требуеть разръзанія того мъста, въ коемъ оное колебаніе примъчается, и выпущенія онаго. Зри язвы мощенки.

TAABA BTOPAN.

О затвер залости любострастной янгекв.

- 1. Зашвера влость любострастная в одном или обоих вичках в, есть опухоль твердая, холодная, едва боль зненная.
- 2. Зашвердълость яичекъ от предшедшаго воспаленія; ибо оная иногда по утоленіи воспаленія остается.

Врачевание требуеть 1) камединной рту-ти купно съ порошкомъ корня волчковаго.

2) теплой припарки состоящей изъ смятчительныхъ травъ и изъ съменъ льна, въ молокъ уваренныхъ. Иногда мазь, состоящая изъ переступня, мужескаго корня, дикаго аврана, и неаполитанской мази больше пользы принесла.

- 3) Иногда прививка бълой грыжи, посредствомъ свъчи, гноемъ бълогрыжнымъ смазанной произведенная принесла пользу.
- 3. Зашвердълость прибавочнаго яичка. Оная и по разогнании опухоли бывшей въ яичкъ остается чрезъ многие годы сряду.
- 4. Затвердълость яичка ракомъ пораженная. Познается по жестокой боли, и по каменной твердости яичка, воспослъдовавшей послъ застарълой окръплости. Врачевание требуеть отнятия яичка, особливо когда съменная тетива найдется еще незатвердъвшею даже до самаго паховаго кольца.

IAABA TPETBA.

0 язвах в любострастных в мошенки.

- 1. Язвы любострастныя мошенки бывають причинены любострастнымь ядомь.
- 2. Онъ въ разсуждении своего положения сушь шроякия.
 - 1) Язвы мошенки закожныя, кои въ самой кожъ обръщаются, и бывають широкія, поверхнія, въ окружности красныя, а по срединь гиюсныя или нечистыя.

Онъ легко врачующся внушреннимъ употребленйемъ камединной ршуши, и внъшнимъ прикладыванйемъ ршушьного бальсама или ршушьнаго бальсамическаго расшвора.

2) Язвы мошенки яичныя проницають даже въ самое ея существо; а познаются щупомъ, такъ же по предшедшему воспаленію, возгноенію яичка, и истеченію вещества бъловатаго волокнистаго.

Когда таковое существо яичка безпрерывно вонъ исходить, тогда по уврачевании язвы остается изсушение яичка, бывающаго величиною едва въ оръхъ.

Врачеваніе требусть, сверьхь внутренняго ртути употребленія, еще и внішняго прикладыванія ртутьнаго бальсамическаго раствора или другаго бальсама, дабы оное вещество яичка вонь не выходило.

3. Язвы мошенки мочевыя; онт проницаюшь внушрь мочеиспускашельнаго ствола; составляють одинь или многія ноздреватыя круглопродолговатыя ттла, вь задней части мошенки ощущаемыя; кои рдтють, краснтють, болять, по истеченіи мочи изъ мочеиспускательнаго ствола, скоропостижно вспухають, и по томь изъ мноточисленныхь скважинь изъ себя испускають мочу вь видт испарины; а на последокь по прошестви нъсколька времени снова въ прежнее состояние приходять.

Врачевание требуеть сверхь внутренняго употребленія камединной ртупи; і) свічи жолобоватой, ртупьным бальсамом смазанной, запускаемой внушрь мочеиспускашельного ствола съ тъмъ, чтобъ язва въ ономъ співолъ зіяющая зажила, а при томъ дабы и шечение мочи въ клешчешую сешь мошенки воспрепятствовано было. 2) Продолговатую и ноздреватую опухоль въ мошенкъ часто слегка выжимать, сулемою или осаженною красною ртупью посыпать, и растворомь ртупьнымь бальсамическимь смазывашь должно.

отд Бленге IV.

О бользняхь предстательной железы.

TAABA HEPBAR.

О вослалении любострастномо предстательной железы.

- 1. Воспаление любострастное предстательной железы причиняется любострастнымЪ
- 2. Знаки онаго суть сїи: 1) Ощущенїе тягости, жару, и боли въ задней кишкъ,

а иногда и цълая подчеревная часть болипів. 2) Перстомъ запущеннымъ въ заднюю кишку ощущается бугорокъ или опухоль твердая и жигучая, подъ самою шейкою мочеваго пузыря ощущаемая. Когда оная опухоль бываешь весьма великая, вы такомы случать оная даже и въ самой срамнопроходной промежности перстомъ ощущается. 3) Теченіе мочи весьма шрудно и мало по малу совсемъ прекращается. 4) Мочевый выпускник весьма прудно, либо и опнюдь не можеть запущень бышь въ мочевой пузырь, и при шомъ оный обрътаеть шамо препятствие или сопрошивление предъ шейкою мочевато пузыря. 5) Нечистопы низомЪ испражняемыя, на себъ показывають видь впечатльнной опухоли; прежестокій и безпрерывный иногда примъчается позывъ къ испражнению низомъ, котя въ прошчемъ тъ же нечистоты низомъ испражняемыя бываюшь весьма жидкія. Таковое воспаленте бываеть весьма опасно; по тому что оное часто распространяется въ съменныхъ пузырькахъ и во всемъ мочевомъ пузыръ, и антоновымъ отнемъ, въ ономъ пузыръ воспослъдовавшимъ, болящаго умерщвляетъ. 6) Иногда бълая грыжа при томъ же случается, а иногда и отб прекращентя оной шаковое воспаление случается. 3.

3. Врачеваніе пребуеть возобновленія былой грыжи и разогнанія воспаленія. Сій показанія сь успъхомь исполняются. 1) Чрезь кровопусканіе. 2) Чрезь употребленіе прохладительного оршада. 3) Пилюлями состоящими изь камединной ртути. 4) Теплыми примочками пріуготовленными изь порошковь смягчительныхь и молока. 5) Промывательными изь воды и смягчительныхь травь пріуготовленными, и вь маломь количествъ наставливаемыми.

I.A.A.B.A. B.T.O.P.A.R.

O нарывѣ любострастномъ предстательной железы.

- 1. Любострастный нарыв предстательной железы есть опухоль оной гноеточащая. Виды онаго сушь сіи:
- 2. Нарывь закрышый. Онь познается. 1) По знакамь преждебывшаго воспаленія. 2) Чрезь осязаніе опухоли ощущаемой вь задней кишкь, во время воспаленія твердой, а по томь мягшей и колеблющейся. 3) Посредствомь мочеваго выпускника, легко вь самой стволь запускаемаго.

Врачеванте онаго состоить вы томы, что если воспаленте предстательной железы ра-

зогнать не льзя; въ такомъ случать надлежитъ т) теплыя и наиболье смягчительныя припарки прикладывать ко промежности срамнопроходной; 2) таковыя же смягчительныя промывательныя насосцомъ впрыскивать въ задній проходъ; когда опухоль въ заднемъ проходъ, запущеннымъ туда перстомъ ощущается уже мягка и колеблющаяся, и сама собою не прорывается; въ такомъ случать мочевымъ выпускникомъ, въ мочеиспускательный стволь глубоко запущеннымъ, или треугольною кривою иглою, въ задній проходъ запущенною, оной вскрыть можно.

- 3. Нарывь открытый предстательной железы. Сей нарывь четвероякимь образомь прорваться можеть.
- 1) Внутрь мочеиспускательнаго ствола, вы коемы оный весьма часто, особливо при вставливании мочеваго выпускника внезапно прорывается. 2) внутрь заднепроходной кишки; что однакожы рыдко случается. 3) Внутрь мочеваго пузыря, что иногда примычается; и 4) вы самой промежности срамнопроходной, что чаще всего примычено.

Проваль познается: 1) Когда большое количество гноя созръвшаго внезапно истекаеть, либо изь мочеиспускательнаго ство-

ла, либо изъ мочеваго пузыря купио съ испускаемою мочею, либо изъ задняго прохода, либо изъ нарыва промежности срамнопроходной; 2) Когда моча истекаетъ свободно, а при томъ лихорадка и прочїе припадки, при воспаленіи бывающіе, внезапно и совсъмъ прекращаются.

Врачеваніе нарыва открытаго требуеть лькарствь очищающихь, насосцомь впрыскиваемыхь либо вы задній проходь, либо вы моченспускательный стволь, коими язва открытая воплощается. А внутренно должно употреблять камединную ртуть.

T.AABA TPETIA.

O затвер Дилой любострастной окриллости пре дстательной железы.

- 1. Затвердълая любострастная окръплость въ предстательной железъ бываетъ отъ любострастнаго яда.
- 2. Затверавлая окрыплость бываеть обыкновенная или простая. Знаки оной суть сіи:
- 1) Прежде бывшее воспаленіе предстательной железы, не перемѣняющееся въ нарывъ.
 2) Перстное осязаніе опухоли твердой, почти не болящей, въ задней кишкъ ощущаемой. 3) Трудное испусканіе мочи. 4) нечистота

стота низомъ испражняемая, имъющая себъ видъ впечаплънной верхушки.

Врачевание требуеть того, чтобъ затвердълую окръплость разбить и разогнать; чего ради должно употреблять: 1) ртуть камединную купно съ другими раздъляющими лъкарствами; 2) мазь ртупьную смъщенную съ мазью свиннаго хлъба, прикладывать ко срамно-проходной промежности; 3) свъчу запускать въ мочеиспускательной стволь. Не должно ли испышывашь и прививку бълой грыжи? Когдажь совершенный запорь мочи случится от за твердълой окръплости предстательной жельзы; тогда посредством каменносъчца, должно разръзашь шъло окръпнувшей и затвератлой желтзы, съ тъмъ намфрентемЪ, дабы жельза могла приведена бышь вь возгноенте.

ноздреватая окръп-Зашвердълая И лость предстательной жельзы. Сте особливое предстательной жельзы бользненное состояніе, чрезь тщательное, посредствомь мочеваго выпускника, испышание самаго мочеваго пузыря, уповашельно ошкрышь можно. Врачеванію же здісь едва есть місто. По учиненіи каменосъченія не должно ли испышы-

Часть L вашь и шого, чтобь вырызань или перевязань ноздреващую окрыплосны ? преда на на на

4. Зашверавлая окрынлость ракомы пораженная. Боль и прочте знаки рака, показующе то, что зашвердълая окрыплость премъняется въ рака, въ тожъ самое время означающь и сте, что бользнь есть смертоносною. Врачевание въ семъ случат предохранишельное въ дъйсшво производишь должно.

отдъление у.

О бользняхъ промежности срамнопроходной и заднято прохода.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

- О Сепщь любострастном срамнолроходной лромежности.
- 1. Свищь любострастный въ срамнопроходной промежности есть нора или пазуха, любострастнымь ядомь причиненная.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующіе.
- 1) Свищь срамнопроходной промежности даже до самаго мочеиспускательнаго ствола проницающій. Онъ познается тьмь, когда моча изв онаго ствола при истечении исходишь многими скважинками или отверстіями.

Bpa-

Врачеваніе онаго, кром'в внутренняго употребленія камединной ртути, требуеть еще и того, чтобь і) вы мочеиспускательный стволь вкладывать свічу пустую ртутьнымы бальсамомы смазанную, дабы истекающая моча не вкрадывалася вы клітчетую сіть срамнопроходной промежности, и дабы язва вы стволі зажила; 2) посыпать місто свищемы зараженное ртутью осаженною красною, и еще сверхы того прикладывать растворы ртутьный бальсамическій.

- 2) Свищь срамнопроходной промежности даже до предстательной жельзы пронидающий. Онь познается по знакамь предшедшаго воспалентя и возгноентя предстательной жельзы, и по воспослъдовавшемь нарывъ вы тойже промежности.
- 3) Свищь срамнопроходной промежности, даже до съменных в пузырьков в проницающій. Оно познается по предшедшему воспаленію и возгноенію съменных в пузырьково, по воспосладовавшем нарыва во той же промежности, и по истеченію съмени. Врачуется же, хотя и пруднае, тамо же образомь, како и перьвый видь.

употреблением камединной риута, погла вра-

vinenaro, a zavancenamb

TAABA BTOPAA.

О свищь любострастномо задняго прохода.

- т. Свищь любострастный задняго прохода, вь окружности онаго, имъеть свое начало оть любострастной заразы.
 - 2. Виды онаго супь следующе:
- 1) Свищь задняго прохода внѣшній. Онь имѣеть свое начало от любострастнаго вереда или нарыва, и от наращенія въ заднемь проходѣ бывшихъ, и худо врачеванныхъ; но внутрь самой кишки не проницаетъ.

Врачеваніе совершается внутреннимъ употребленіемъ камединной ртути. Растворъ ртутьный бальсамическій насосцомъ впрыскивать или внъ прикладывать можно. Иногда однимъ бальсамомъ ртутьнымъ врачуется.

3. Свищь задняго прохода внутренній. Онь причиняется по большей части язвою бывшею вь предстательной жельзь или съменномь пузырькь. Познается же по предшедшему воспаленію и возгноенію оныхь частей, и истеченію сьмени вь заднюю кишку во время плотскаго совокупленія.

Врачеваніе испытывать можно впрыскиваніемь раствора ртутьнаго, и внутреннимь употребленіемь камединной ртути. Когда врачеваніе бываеть безуспытно, вы такомы случать должно искусно разрызать всы подлежащія части, дабы лыкарства кы поврежденному мысту, или кы самому дну свища, прикладываемы быть могли.

TAABA TPETBA.

О сожатіи любострастном задняго прохода.

Сожащие устья задняго прохода и задней кишки есть самородная корча сих в частей, любострастным в ядом в причиненная.

Врачеваніе требуеть того, чтобь і) разширить сожатое устье задней кишки, посредствомь свычи, ртутьнымь бальсамомь смазанной. Свычи оть времени до времени толще вкладывать, и внутренно употреблять камединную ртуть; 2) если сожатіе задняго прохода оть свычь не разширяется; вь такомь случаю учинить насыченіе на самомь устью задняго прохода, и при томь продолжать вкладываніе свычь.

IAABA YETBEPTAA.

О наращеніях в любострастивіх в.

1. Наращенія любострастныя ноздреватыя причиняются любострастнымь ядомь около задняго прохода.

- 2. Мѣсто, на коемъ наичаще таковыя наращентя случаются, у мущинъ подъ самою крайнею плотью плъшки, а у женщинъ около задняго прохода. Однакожъ оныя видалъя такъ же на губкахъ дътороднаго уда женскаго, на всей мошенкъ, на пахахъ, на устахъ, на лицъ, даже одинажлы и на цъломъ тълъ оныя видъть случилось.
- 3. Сія бользнь кажешся состоить вы самихь закожныхь сосочкахь оть любострастнаго яда раздражаемыхь и сверхьестественно вырастающихь.
- 4. Таковыя наращентя называются различными именами, взглядомы ихы вида и величины.
- 1) Наращенія гребенныя. Они бывають своимь видомь и величиною подобны пътушьсму гребню, плодамь ежевичнымь, шелковичнымь и проч.

Врачеваніе оных в кром в внутренняго ртупи употребленія, требует и того, чтоб в таковыя наращенія ежедневно дважды особливою свъдающею водою, или сладкою ртупью растворенною в жидком в усыпительном в Сиденгамовом состав посредством перушка или кисточки смазываемы, и по том немедльно ртупьною мазью св верху покрываемы семы

емы были. Такимъ образомъ оныя легко чрезъ нъсколько недъль совершенно пропадають.

2) Наращенія фиговыя. Они бывають гладкія, видомь и величиною изображають винную ягоду, или фигу. Висять на толстомь черешкь, и наилучте истребляются посредствомь перевязки или отсьченія. А самое мьсто, откуду оныя вырьзаны, вытяжкою свинцовою смазывать должно, дабы тьжь наращенія снова не произошли.

3) Наращенія цвышныя, или цвышочныя. Они величиною и видомы изображающь голову цвышной капусшы. И сей виды наращенія ножемы

или ножницами отнимать должно.

4) Наращенія сосочковашыя. Иногда вся кожа на мощенкѣ, или на пахахъ, или около задняго прохода бываешъ покрыша весьма мѣлкими сосочками, чрезъ увеличищельное сшекло зримыми, кои, какъ я примѣшилъ, сушь не чшо инное, какъ весьма мѣлкія наращенія. Врачующся шѣмъ же способомъ, какъ и наращенія гребенныя.

the service of the pasty account

to an animal All so accompanies of the

отдвление уг.

О бользняхъ паховыхъ.

IAABA ПЕРЬВАЯ

О мобострастных даховикахв.

- 1. Паховики любострастные суть опухоли паховых в жельзы; коих в числомы иногда токмо одины, а иногда многте на одномы или на обоих в пахах в раждаются.
- 2. Видь оныхь большею частію бываеть круглый или круглопродолговатый. Величиною же они иногда малы, иногда съ голубиное или съ куриное яицо, а иногда и побольше кулака случаются.
- 3. У кормилиць, кои сосцами своими воспитывають дьтей любострастнымь ядомь
 зараженныхь, примьчены паховики подь крыльцами. Я одиножды видьль у нихь паховика на
 самомь лонь. У дьтей, кормилицею, любострастной бользни подверженною, воспитываемыхь, опухоли подчелюстныя или зобы любострастные раждаются.
- 4. Различіе паховиковь, въ разсужденіи пріобрътенія, есть четверакое. А именно:
 - 1) ПаховикЪ бѣлогрыжный. ОнЪ весьма часто примѣчается во время бѣлой грыжи воспалишельной, и послѣ послабленія бывшаго во-

спаленія въ мочеиспускательномъ стволь, снова самъ собою пропадаеть. Сей видъ паховика, какъ кажется, раждается от одного воспаленія мочеиспускательнаго ствола, чрезъ сочувствіе чувственныхъ жилъ.

Врачевание таковаго паховика требуеть ль-

- 2) Паховикъ от мьстной заразы. Любострастная зараза, от прекратившейся или мало текучей былой грыжи, а чаще от засохшей малой язвы бывшей вы плышкы, или вы крайней плоти, чрезы сукровищеносные сосуды будучи занесена вы паховыя жельзы, причиняеть сей виды паховика.
- 3) Паховикъ от повсюдной заразы. Сей видъ паховика случается послъ любострастной бользни уже существующей и повсюду въ тъль распространившейся.
- 4) Паховикъ от пошаенной любострастной бользии. Иногда безъ всякихъ другихъ настоящей любострастной заразы знаковъ, паховики оказываются происходяще от потаенной бользии.
- 5. Различія паховиковь, вь разсужденій ихь свойства, примъчаются слъдующія:
 - 1) Паховикъ воспалительный. Онъ раветь, краснветь, горить или жжеть, болить, бываеть твердовать, и возрастаеть величиною съ куриное яйцо. Едва можно его раз-

бить и разогнать, по большей части онъ перемъняется въ возгноенте.

Врачевание состоить вы томы, чтобы

- а) внъ или съ верху покрывать новоначинающійся паховикъ тенловатою густою припаркою разбивающею, состоящею изъ порошковъ смягчительныхъ разваренныхъ въ водъ, или мазью пріуготовленною изъ меду сырцу и корня мандрагоры; в) внутренно давать пилюли состоящія изъ камединной ртути, а при томъ проносное чрезъ каждые три дни употреблять.
- 2) ПаховикЪ возгноивающійся. Если вожженный паховикЪ симЪ способомЪ разогнанЪ быть не можеть; вЪ такомЪ случаѣ возгноенію пособлять должно пластыремЪ смягчительнымЪ, царскою мазью и густою тепловатою смягчительною припаркою. Употребленіе пищи должно быть изобильнѣе; а при ощущеніи колебанія влаги содержимой вЪ опухоли, оную разрѣзать или вскрыть должно.

Если жЪ паховикъ сими средствами не можетъ быть приведенъ до совершеннаго колебанїя или возгноенїя; въ такомъ случать частицу разъ- вдающаго адскаго камня, величиною съ чечевицу, или малую горошинку, чрезъ одинъ или два часа къ самой срединъ паховика прикладывать; а прижженной струпъ царскою мазью смъщанною съ неаполитанскою, и тепъ

лова-

ловашою смягчишельною припаркою съ верьху прикрывать должно. Таковымъ образомъ паховикъ нечувствишельно изъ себя испускаетъ гней въ немъ содержимый, и мало по малу совсъмъ пропадаетъ.

Внутренно пилюли состоящія из вкамединной

ртупи продолжать нужно

3) Паховикъ затвердълый. Онъ познается твердостью и неощущениемъ никакой боли; и иногда бываетъ столь жестокъ, что ни коими средствами не можно онаго ни разбить, ниже въ гной превратить.

Разогнаніе испышыващь должно внутреннимь камединной ртути употребленіемь, вытяж-кою омега, камеди баккаута и другими разбивающими; внѣ прикладывать неаполитанскую мазь смѣтенную съ равною частью мази свиннаго хлъба и порошка корня мандраторы.

Иногда и жидкая примочка состоящая изъ водянаго ртупьнаго раствора воспользовала. Если затвердълый паховикъ не можетъ быть разогнанъ, ниже приведенъ смягчительными въ возгноенте: въ такомъ случат разътдающий камень, тъмъ же способомъ, какъ и при перьвомъ видъ мною сказано было, прикладывать надлежишъ.

4) Паховикъ отноковый. Иногда затвердълаго паховика великая скружность вспухаеть отнокомь, комъ, и отъ прикосновения перста въ себъ сохраняетъ впечатлънную ямку.

Врачеваніе требуеть теплой, жидкой, разбивающей и ароматической теплой примочки, и повторенія проносныхь, кои сверхь внутренняго ртути употребленія, давать должно.

5) Паховикъ антоновымъ огнемъ пораженный. Паховики въ цынготныхъ тълахъ, гнилыхъ и опочивающихъ въ больницахъ, иногда отъ разъъдающаго лъкарства чрезмърно увеличеннаго, и къ нимъ приложеннаго, превращают ся въ антоновъ огонь.

Врачеваніе вЪ такомЪ случав требуетЪ внутренняго и внвшняго употребленія лвкарствЪ тнилости сопротивляющихся, какЪ то: лихорадочной корки, канфоры и бараньей травы.

б) НаховикЪ язвенный. Язвы на паховикахЪ случившіяся иногда бываютЪ малыя и легкія, и удобно исцѣляются фагаденовою водою или ртутьнымЪ бальсамомЪ. А иногда таковыя язвы распространяются широко, болятЪ чрезмѣрно, бываютЪ сосковатыми, сопротивляются всякому лѣкарству, и на себѣ являютЪ видЪ опухоли вЪ рака претворяющейся. Врачеваніе требуетЪ того, чтобЪ внутренно давать камединную ртуть купно сЪ лихорадочною коркою; а внѣ употреблять растворЪ ртутьный бальсамическій, и присыпать оса-

женною

женною красною ршушью, шогда когда ноздреванное мясо при томъ нарастаеть.

7) ПаховикЪ свищевый, ноздреваный, или дыравый. ПаховикЪ возгнояющійся, вЪ разныхЪ мъстахъ открывается, и будучи оставленъ безЪ всякаго смотрвнія, иногда на одномЪ, а иногда на многихъ мъстахъ получаетъ глубокіе свищи, норы или пазухи.

Врачевание требуеть того, чтобь норы и пазухи свищевыя вскрышь, разрѣзать, и щакимъ же образомъ, какъ и перьвый видъ паховика врачевать.

8) ПаховикЪ ракомЪ пораженный. Паховики чрезЪ многіе годы будучи оставлены безЪ всякаго лѣченїя, либо бывши пользованы неприличными лекарствами, превращаются вЪ настоящаго запвердълаго, окрыплаго или ноздреватаго рака. Иногда взваръ лихорадочной корки, водка настоянная со смирною, жидкій усыпишельный Сиденгамовъ составъ, и сладкая или мореная ртупь производять чудесное дъйствие.

Врачевание требуеть того, чтобь выръзать цълаго рака, если токмо есть надежда истребишь онаго съ корнемъ.

into account makes and sociation

IAABA BTOPAR.

О затвер Авлости закожнаго тука.

Зашвера влость любострастная закожнаго шука, жира или сала бываешь на самомь чревъ от любострастнаго яда.

Врачеванте требуеть, кромъ внутренняго ріпуши употребленія, еще и того, дабы зашвердълость неаполишанскою мазью нъсколько разв' вв сушки смазываема была.

OTABAEHIE VII.

О закожныхъ любострастныхъ бользняхъ.

TAABA HEPBBAR.

0 любострастных длятнах в.

- 1. Любострастныя пятна бывають красножелиыя, круглыя, нъсколько возвышенныя, бълыми краями окруженныя, от любострастнаго яда происходящія.
- 2. Оныя весьма часто выступають около чела, и составляють такь называемой венеринь вънець. Не рълко на лицъ, передней части туловища, и между лопатокъ, а иногда почти по всему шѣлу случаются.
- 3. Они весьма зудять и чешутся, иногда бывають весьма малы какь веснушки, а ино-

иногда весьма широки. У младенцовъ рожденных в отв матери подверженной любострастной бользни, не много спустя послъ родовь, выступають около задняго прохода и дътородных в частей.

4. Врачеваніе требуєть внутренняго употребленія камединной ртути. А внъ фагаденовою водою или разведеннымь ртутьнымь растворомь оныя смывать должно.

IAABA BTOPAN.

О любострастной гесоткв.

- 1. Любострастная чесотка или короста есть не что инное, какъ пупырышки твердые, красные, на самой верхушкъ гноящееся и струпьями покрытые.
- 2. Таковая чесошка, купно съ любострастными пятнами цвъта желтаго или мъдянаго, на лицъ и на прочихъ частяхъ выступаетъ.
- 3. Оная врачуется такимъ же образомъ, какъ и любострастныя пятна.

TAABA TPETBA.

0 трещинах в любострастных в.

т. Трещины любострастныя бывають сухи и глубоки, на кожь около задняго прохода, хода, и внъшняго устья рукава матки, а иногда даже на ручных владонях и ножных подошвах в примъчаются.

2. Онъ врачующся весьма прудно.

Внутренно должно давать камединную ртуть; а внъ прикладывать насыщенной растворь сулемы и мазь состоящую изъ осаженной бълой или красной ртути.

TAABA YETBEPTAA.

О лупырышках в мобострастных в.

- 1. Пупырышки любострастные сперьва бываюшь пятнами довольно возвышенными, по томь вскоръ премъняющся вы язвы закожныя.
- 2. Они всего чаще занимають мъсто на голеняхь и около ручныхь кистей, а иногда около задняго прохода и дътородныхъ частей.
- 3. Они рѣдко остаются долговременно безъ перемѣнентя въ язвы; и для того сверьхъ внутренняго употреблентя ртути, немедлѣнно и часто ртутьнымъ растворомъ оныя смывать должно.

olent fe benne emos na napovit m my

IAABA HATAA

О лишаях в любострастных в.

- т. Лишай любострастный есть пятно красное, наполненное самыми мълкими со-сочками, пупырышками или пузырьками, премъняющимися въ чешуйки.
- 2. Лишаи часто по ушамъ, головной макушкъ, а иногда какъ на груди, такъ и на прочихъ тълесныхъ частяхъ случаются.
- 3. Врачеваніе шребуеть того, чтобь внутренно употреблять камединную ртушь купно со взваромь пасліона; а внъ пользуеть частое мышье той части, на коей лишай обрътается, фагаденовою водою, или растворомь сулемы.

LAABA HECTAR.

О струпьях в головных в любострастных в.

- 1. Струпья головныя любострастныя бывають числомь многія, сухія, бълыя, или зеленоватыя, обыкновенно на головной макушкь, а иногда такь же около чела и висковь, у больныхь любострастною бользнію зараженныхь примъчаемыя.
 - 2. Виды оных в суть следующе:
 - 1) Струпья от любострастной бользни повестьюй или явной. Они бывают сопряжены часть 1. Д св

съ любострастными пятнами, а при томъ купно и съ нъкоторыми знаками любострастной бользни.

Они врачующся внутреннимЪ употреблентемЪ камединной ртути; а внѣ ртутьнымЪ бальсамомЪ по мѣстамЪ бережно смазываемы быть должны. ВЪ закоренѣлой болѣзни, по примѣчантямЪ моимЪ, смазыванье струпьевЪ фагаденовою водою, или растворомЪ сулемы пользуетЪ.

2) Струпья от любострастной бользни потаенной или скрытной. Оныя у младенцовы рожденных от матери подверженной бользни, или у дътей воспитываемых таковоюжы кормилицею, безы прочихы знаковы сея бользни случаются. Врачеваніе состоиты вы томы же средствь, какы и вы перьвомы видь.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

О власола деніи любострастнолю.

- 1. Власопаденте любострастное есть то, когда власы не токмо изъ головы, но и изъ всего тъла низпадають.
- 2. Иногда брови и въки очные, такъ же и власы покрывающіе лоно низпадають.
- 3. Врачевание бываеть безуспытно, если корешки власовь оть любострастнаго яда уже совсымь истребились; ибо вы таковомы

случав, власы, и по уврачевании сея бользни, болье никогда не выростають.

IAABA BOCKMAN.

О лоргъ ногтей.

т. Порча ногшей бываеть либо на одномь которомь ни есть, либо вдругь на многихь перстахь, съ настоящими язвами.

2. Таковая порча чаще на ножных в, чъмв

на ручных в ногтях в примъчается.

3. Иногда она имъешь свое начало ошь явной или повсюдной, а иногда ошь скрышной или часшной любострастной бользни.

4. Врачевание совершается посредствомъ внутреннято употребления камединной ртути, особливо если еще и сулемы растворъ въ мастихитной водкъ внъ употребляемъ будетъ.

TAABA AEBATAA.

О зуль любострастномь.

1. Зудь, или чесошка любострастная, есть безпрерывное ощущенте побуждающее къ то-му, чтобъ себя самаго чесать и царапать ручными ногтями, отъ любострастнаго яда происходящее.

2. Зудь вы дётородных в частях в ощущаемый, раждается у мущины на самой Д 2 плышплъшкъ дътороднаго уда, а у женщинъ на самомъ внъшнемъ устью рукава машки, отъ нечистаго совокупленія. Онъ иногда бываеть столь сильный и жестокій, что больные сами себъ своими ногтями кожу разцаранывають до крови, и чрезъ многіе дни продолжается.

3. Врачеваніе требуеть частаго мытья зараженных в частей, помощію водянаго ртушьнаго раствора, или внёшняго ртушьной мази употребленія.

TAABA AECATAA.

0 проказѣ любострастной.

- 1. Любострастною проказою называется то, когда кожа совсъмъ обнажается отъ власовъ, и при томъ обезображивается тръщинами, буграми, или возвышенными наращентями и струпьями, на лицъ и другихъ частяхъ тъла, отъ любострастнаго яда происходящими.
- 2. Врачеваніе требуеть, сверхь внутренняго употребленія ртути, еще и того, чтобь вся поверхность тьла была смываема ртутьнымь растворомь. Однакожь настоящая проказа ртутью не врачуется, но взваромь багульника.

ГЛАВА ОДИНАДЦАТАЯ.

О язвах в любострастных в закожных в.

- 1. Язвы любострастныя закожныя обезображивають только одну кожу, большею частью бывають круглыя, сальныя, и имъють краи мягкія и красныя.
- 2. Любострастныя язвы широкія много сходствують сь ракомы чувственножильнымь, но вы любострастныхы язвахы краи бывають мягкіе и красноватые; а вы пораженныхы ракомы бывають весьма твердые и блюдные.
- 3. Язвы от любострастной заразы повсюдной или явной раждаются от предшедших в любострастных в пятень или пузырков в, и легко познаются по предшедшим в, или еще существующим в любострастным в припадкам в. Он врачуются внутренним в употреблентем в камединной ртути; а внъ ртутьной бальсам в употреблять должно.
- 4. Язвы от любострастной заразы сокрытой раждаются без обыкновенных в любострастной бользни знаков в, от насльдственной или пртобрытенной и худо врачеванной сей бользни. Он в очищаются будучи сверьху посыпаемы мореною ртутью, если только сумь любострастныя; но оная отнюдь

не пользуеть, если онъ имъють свое начало от другой причины.

отдъление упп.

О любострастныхъ очныхъ бользняхъ.

I.AABA HEPBAR.

О любострастномо окобольнии.

- т. Любострастное окобольние есть краска и боль въ очахъ, отъ любострастнаго яда.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующіе:
- 1) Окобольніе отв былой грыжи есть жестокое воспаленіе очей, у мущинь отв пре-кращенія былой грыжи, а у жень отв пре-кращенія были раждающееся. Причиною сего есть вещество былой грыжи, чрезь преселеніе засышее вы клытчетой сыпи союзной оболочки ограждающей очной шары и очныхы выковы поверхность.

Распознавается же симъ образомъ: на другой или третій день послѣ прекратившейся бѣлой грыжи раждается преизобильное изъ краснѣющаго ока теченіе гнойной блѣдножелтоватой влаги весьма подобной веществу, во время бѣлой грыжи изъ дѣторолнаго мужескаго уда изтекающему. Краска очей почти всегда перемѣняется въ воспа-

леніе столь сильное, что роговая очная оболочка совстмъ помрачается, и отъ чрезмърной опухоли бълочной плъвы, кажется якобы въ ямку вдавленного.

Сте окобольние по болшой части премъняется въ нагноенте и язву роговой и бълочной оболочекь; оть чего непрозрачность роговой оболочки, или возгноение ока, либо неизпълимая слъпота, по причинъ разрушенія внутренних в частей очнаго яблока приключающся.

Врачевание требуеть того, чтобь і) пустить кровь и дать проносное воспаленію сопрошиваяющееся; 2) внутренно употребляшь камединной ртуши по 30 гранъ ежедневно; 3) воспаленное око повсечасно промывать теплымь ртупьнымь молокомь или разведеннымъ растворомъ мореной ртути, посредствомъ маленькой очной чашечки либо другаго сосудца. Симъ однимъ средствомъ я счастливо уврачеваль многихь, и отвратиль слъпоту.

Врачевание понынъ употребляемое есть сие: кровопускание, къ очнымъ глузкамъ присшавленныя нарывныя, банки, рожки, источники, проносныя чрезв каждую неделю предписываемыя, тепловатыя припарки разбивающія кЪ очамъ очамЪ, и смягчишельныя примочки кЪ дѣтородному уду прикладываемыя, дабы бѣлая
грыжа снова оказалась. Разрѣзаніе ока и союзной очной оболочки не принесло ни какой
пользы. Я видѣлЪ многихЪ отъ сего способа
ослѣпшихЪ. Надлежало бы испытать, что
могло бы произвести прививаніе бѣлой грыжи,
посредствомЪ малой свѣчи смазанной гноемЪ
ядовитой бѣлой грыжи, и запущенной въ мочеиспускательной стволъ, дабы оная въ сей
болѣзни снова отрыгнулась?

2) Окобольніе от заразы повсюдной или явной. Сей видь имьеть свое начало от любострастной остроты, по всему тьлу разлившейся. Краска бываеть долговременная, однакожь не столь жестокая, какь вы окобольній от былой грыжи происходящемь. Сей видь бользни послабляеть около утренняго времени, и никогда не премыняется вы воспаленіе ока, какы то случается вы первомы.

Врачуется внутреннимъ употреблениемъ камединной ртути; а внъ припарки и примочки тепловатыя состоящия изъ ртутьнато млека, или очной ртутьной бальсамъ прикладывать должно. Взваръ просвирокъ, растворивъ въ фунтъ онаго гранъ одинъртути, иногда приносилъ скорое облегчение.

TAABA BTOPAN.

О гноетесении отномь мобострастномь.

- 1. Гноешечение очное дюбострастное есть то, когда гнойная мокрота по краямь очных въковъ исшекаеть.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующіе:
- 1) Гноешеченіе очное отв прекращенія бълой грыжи или бъли. Сей видь есть предзнаменованіемь имьющаго быть окобольнія, отв бълой грыжи происходящаго; а иногда оно бываеть и долговременною бользнію.

Врачеванте требуеть кромъ внутреннято употреблентя камединной ртути, еще и очнаго краснаго бальсама, или ртутьнаго раствора въ взваръ просвирокъ, какъ выше въ главъ о любострастномъ окоболънти сказано.

2) Гноетечение любострастное новорожденных дътей. Младенцы рожденные от вараженной матери, по прошестви нъсколька недъль послъ родовъ начинають страдать опухолью очных ръсницъ; спустя немного времени великое количество бъло зеленоватато гноя истекаеть изъ ока, такъ какъи изъ мочеиспускательнаго ствола, въ случать бълой грыжи; при чемъ воспаление ока иногда малое а иногда жестокое бываетъ.

Таковое гноешечение есть первышимь знакомь любострастной заразы потаенно кроющейся вы младенцы. Иногда оно оказывается безы всякаго любострастнаго знака; и будучи худо лычимо, премыняется вы весьма худое возгноение ока, и вы слыпоту совершенную.

Брачеваніе требуеть тахь же средствь, что и первый видь.

TAABA TPETBA.

О лятнах в любострастных в роговой отной оболотки.

- 1. Пятна любострастныя на роговой очной оболочкъ суть не что иное, какъ перемъна ея цвъта, любострастнымъ ядомъ причиненная. Иногда токмо нъкоторая ея часть, а иногда вся она помрачается, и потемняется.
- 2. Пятна от предшедшей любострастной очной бользни; какъ то от прежде бывшаго окобольнія, гноетеченія, или оть язвы любострастной на роговой оболочкь.

Врачевание требуеть внутреннято камединной ртупи употребления; а внъ пятно, или очную роговую оболочку потемнъвшую, растворомъ ртупи, ежедневно по два раза посредносредствомъ кисточки очищать, или только слегка оной касашься, и по томъ мазью красною очною, количествомъ около грана, трижды въ день смазывать должно.

3. Пятна от потаенной заразы новорожденных в дътей. Новорожденные младенцы, коих в мать зараженна была любострастною бълью, часто страждут помрачентем в роговой очной оболочки, изсущентем и бездъйствтем вочей.

Врачеваніе, посредством ва такарство для перваго вида похваляемых ва самом вачаль бользни производимое в ва дъйство, весьма часто приносить пользу.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ.

О язвах в любострастных в роговой отной оболотки.

- 1. Любострастная язва на поверхности роговой очной оболочки бываеть от любострастнаго яда.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующе.
- 1) Язва ошь любострастной очной бользни, какь то оть преждебывшаго, или еще существующаго окобольнія, бълою трыжею, или любострастною заразою причиненнато.

Врачеваніе требуеть кром внутренняго употребленія камединной ртути, еще и то-

то, чтобь внъ прикладывать очной ртутьной растворь разведенной розовымь медомь.

2) Язва от заразы скрытной или повсюдной.

ВЪ объихъ случаяхъ иногда найдены были язвы въ роговой очной оболочкъ.

ГЛАВА ПЯТАЯ.

О любострастномъ загносній отной камеры.

- 1. Загноеніе вы передней очной камеры. бываеты оты любострастной заразы.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующіе:
- 1) Загноеніе очной передней камеры отб прекращенія бълой грыжи. Я видъль сей видь очнаго загноенія бывшаго безь жестокаго вожженія. Проносныя лькарства и теплая примочка, изь взвару корня просфирокь состоящая и сь молокомь ртупьнымь смъщенная принесли явственную пользу.
- 2) Загноеніе очной передней камеры отб любострастнаго очнаго воспаленія. Когда ротовая очная оболочка будучи развъдена гноемь, вь очных в камерахь скопившимся, тръснеть или прорвется; тогда очныя влаги отб гноя испортившіяся и разжидъвшія, вонь вытекають; а отб того очной луковицы бездъйствіе, изсушеніе и слъпоша неисцълимая послъдують.

 Вра-

Врачеванте новоначинающагося очнаго загноентя есть тожь самое, что и въ случать окобольнтя, бълою грыжею причиненнаго.

TAABA WECTAR.

О свищь слезномь мобострастном?.

- 1. Свищь слезный любострастный есть истечение гнойной мокроты, оть давления слезныхь точекь бывающее, оть любострастнаго яда засъдшаго вь желъзкахь слезнаго мъшечка.
 - 2. Виды онаго супь сїи.
- 1) Свищъ слезный ошъ прекращентя бълой грыжи. Врачуется внутреннимъ употреблентемъ камединной ртути, а внъшнимъ прикладывантемъ самаго тончайшаго водянаго раствора. Иногда такой свищъ бываетъ отъ скрытной заразы.
- 2) Свищь слезный ошь костовдицы слезной кости. Сей видь есть хуже всъхъ прочихь. Врачевание требуеть, сверьхь внутреннихь лъкарствь, еще и мастихичной водки смышенной съ усыпительною ртупью, прикладываемой къ самой костовдицъ.

I.AABA CEABMAN.

О ягменцѣ любострастномъ.

Ячменець любострастный есть шишка, или бугорокь красный, малому вереду подобный, биый, на ресницахь очных выковь, отв любострастного яда нарастающій.

Врачуется внутреннимъ употреблениемъ камединной ртути, и внъшнимъ прикладываниемъ ртутьнаго молока.

TAABA BOCKMAN.

О вылымы любострастномь.

- 1. Бъльмо любострастное есть слъпота от непрозрачности крысшалловидной горошинки, причиненной любострастною заразою.
- 2. Бъльмо от прекращентя бълой трыжи. Иногда безъ окоболънтя, бълою грыжею причиненнаго, бъльмо раждается. Однакожъ я дважды видълъ непрозрачность или поираченте крысталловидной горошинки, оставшую по уврачеванти окоболънтя, бълою грыжею причиненнаго.

Врачеваніе предпринимать можно посредством внутренняго употребленія камединной ртути, или пилюль составленных в из в мореной ртути; а если врачеваніе бываеть без вустытно, в в таком в случа в должно сперьва предпринять излыченіе быльма.

TAABA AEBATAA.

0 слѣлотѣ любострастной.

- т. Слъпота любострастная есть помраченте зрънтя, безъ явственнаго очнаго повреждентя, причиненное любострастнымъ ядомъ.
 - 2. Виды онаго сушь сїи.
- 1) Слъпота от нечистаго совокуплентя. Оная примъчена была вскоръ послъ бывшаго соитя. Въ семъ случат немедлънно надлежить внутрь давать проносное лъкарство и камединную ртуть.
- 2) Слапота от повсюдной или явной заразы. Сей видь слапоты обыкновенно сопряжень бываеть сь очною болью и безсонницею. Слапота раждающаяся от костнаго наращентя или бугорка сдавливающаго чувственную зрительную жилу, имаеть свое начало либо от водяных вы сатеобразной очной оболочка, или вы зрительной чувственной жила, которую посредствомы слинопроизведентя лачить совытують.

Внушренно можно давашь камединную ртупь, или сулему купно со взваромъ волчьято перца.

80 тлухота. гноетечение изъ ушей.

отдъление их.

О любострастных в ушных в бользняхь.

Г.ЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О глухоть любострастрастной.

- 1. Глухота любострастная есть совершенное или несовершенное потеряние слуха причиненное любострастным в ядом в.
 - 2. Виды онаго суть сїи:
- 1) Глухота от прекращентя бълой грыжи, познается тъмъ, что не много спустя по прекращенти бълой грыжи примъчается.
- 2) Глухоша ошь косшнаго наращенія, или ошь ушной стры, или ошь косшот дицы слуховаго органа.
- 3) Глухота от порчи любострастной вы челюсти существующей; какы то от Евстах тевой трубы сростшейся, по причинь бывшей вы ней язвы, или захряснувшей, или сожатой распухшими миндалинами.
- 3. Врачеваніе во всъх видах в глухоты требуеть внутренняго камединной ртути употребленія.

TAABA BTOPAN.

О ушномъ гноетегении мобострастномъ.

1. Любострастное гноетечение ушное есть то, когда гнойная мокрота истекаеть изб слу-

слуховаго внъшняго прохода.

- 2. Виды онаго супь сіи:
- 1) Гноетечение ушное простое, безъ язвы, по прекращени бълой грыжи, иногда случающееся.

Врачеваніе требуеть употребленія ртути внутренняго, и впрыскиванія водянаго ртутьнаго раствора.

2) Гноешеченте от костевдицы. Слуховыя косточки и костяный ушный своды иногда от любострастной костевдицы разывлены бывають. От чего смрадная и острая мокрота истекаеть, слуховыя косточки воны исходять, и неисцылимая глухота послыдуеть; а когда еще от костевдицы и весь каменистый слуховый отростокы даже до самаго мозга разывдены будеть, то оты того и самая смерть приключиться можеть.

Врачеваніе шребуеть кромѣ внутренняго камединной ртути употребленія, еще и того, чтобь растворь ртутьный бальсамическій быль впрыскиваемь вы самую слуховую впа-дину.

отдъление х.

О бользияхь любострастныхь носовыхь.

TAABA HEPBBAA.

О любострастномо насморкв.

- 1. Любострасшный насморкъ есть теченіе гнойныхъ мокротъ изъ самихъ ноздрей, безъ явственной язвы случающійся.
 - 2. Виды онаго сущь сїи:
- 1) Насморкъ бълогрыжный, или бълая грыжа носовая. Спустя не много времени по прекращени бълой грыжи, иногда случается течене гнойной и изобильной клейкой мо-кроты изъ ноздрей безъ всякой язвы въ оныхъ; мокрота истекающая бываетъ весьма подобна мокроть истекающей при бълой грыжъ.

Врачеваніе требуеть внутреннаго употребленія камединной ртути; а внъ надлежить ноздрями втягивать тончайтій ртутьный растворь.

2) Насморкь ошь внушренией заразы происходящій; когда напримърь посредствомы платка, или полошенца, или ручныхь перстовь, любострастный ядь ноздрямь сообщается. Врачуется тымь же образомы, какь и первый.

TAABA BTOPAN.

О язвъ любострастной носовой.

- 1. Язва любострастная носовая случается отв любострастнаго яда внутрь или внъ носовой впадины.
 - 2. Виды оной сушь сїи:
- 1) Язва носовая внышняя. Сперьва раждается красное пятно около носовых боковь; по томь оное мало помалу возвышается бугоркомь плоскимь, перемыняется вы язву, разывдаеть носовые бока и далеко повсюду распространяется, если правильное лычение употреблено вы скоромы времени не будеть.

Врачеванте пребуеть того, чтобь болящее мъсто внъ растворомь ртупьнымь бальсамическимь покрываемо, а внутрь камединная ртупь употребляема были.

2. Язва носовая внутренняя, есть язва внутрь самих вноздрей, которая распознается по истеченію тноеватой сукровицы, и чрез разсмотр вніе ноздрей.

Врачеваніе внутреннее требуеть камединной ртути купно сь дурнымь духомь; а внъ должно впрыскивать насосцомь, или ноздрями втягивать воду ртупьную известковую, или бальсамическій ртупьный растворь, смъщенный сь розовымь медомь.

Е 2
3)

3) Язва носовая костефдная или гніючая распознается чрезь истеченіе гнойной и при томь весьма смердящей сукровицы; а иногда и отломки ноздреватых в косточекь, или носовой перегородки сь возгрями высмаркиваются; и весь нось внизь приупадаеть.

Врачеваніе есшь що же самое, что и при первомъ видъ.

4) Язва носовая пазухи мокрошной лбинной. Язва костебдная или гніючая раждается надь носовымь корнемь, проницающая вь самую лбинную мокрошную пазуху; что посредствомь щупа испытывается.

Врачеваніе требуеть того, чтобь костефаная сукровица могла свободно истекать вонь чрезь устье пазухи, зіяющее вы носовую впадину; а еслибы оное было сростшееся, вы такомы случать должно вы оной пазухъ вны учинить прободеніе.

IAABA TPETBA.

О везобразін носа любострастномв.

- 1. Безобразїе носа любострастное есть пріупаденіе носа, или потеря онаго съ объихъ или съ одной стороны.
 - 2. Виды онаго сушь сїи:

1) Безобразїе носа отв пріупаденія онаго. Когда костевдица развъдаеть носовую перегородку поддерживающую весь нось; или когда, какв то иногда случается, оная портимть и собственныя носовыя косточки; вы такомы случать вст внытія носа части внизь приупадають: лице таковыхы людей, подобно обезьянь, обезображивается, и цълая жизнь оныхы представляеть явственные знаки преждебывшей любострастной бользни.

Таков бользненный припадок весть неисцылимый; иногда вмысть св носомы и цьлое лице чудным вобразом вобезображивается.

2) Безобразїе от потери боковой части носа. Когда съ одной или съ объихъ сторонъ носа нижняя онаго хрящевая часть от въ извы разъъдены и истреблены бывають; въ такомъ случат носъ только въ одну или въ объ ноздри безобразно зїяеть, либо съ одной или объихъ сторонъ теряется. И сей болъзненный припадокъ, равно какъ и первый, есть неизлъчимый.

IAABA YETBEPTAA.

О безгласт мобострастномъ.

г. Безгласте любоспірастное есть не что иное, какъ непріятное ръчи произношенте.

2. Виды онаго супь сїи:

- 1) Безгласте происходящее от повреждентя ноздрей. Когда ноздри язвою или опухолью любострастною завалены бывають; вы такомы случат произношенте ртчи, одними только устами, безы всякаго содтиствтя ноздрей, бываеты.
- 2) Безгласте от повреждентя челюстей, как то от гортани язвами покрытой, от разътденнаго язычка, и от сквознаго отверствя въ поднебеньъ.

Врачеваніе требуеть отвращенія того порока, который есть причиною безгласія.

отд Бленіе хі.

О бользияхь любострастныхь усть.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О мологницѣ любострастной.

1. Молочница любострастная есть не что инное, какъ малыя язвы во впадинъ рта, на поверхности онаго бывающія. Молочница не токмо занимаєть всю впадину челюстей, миндалины и язычекъ; но и всю внутренную поверхность губъ и самые углы оныхъ. Но молочница ртутью причиняемая изобильно случается по сторонамъ и при основаніи языка,

языка, также на внутренностях вы ланить, и вы самых в устьях в Стеноновых в протоков слиноточащих в.

- 2. Виды молочницы суть сїи:
- 1) Молочница от повсюдной заразы. Таковыя от молочницы малыя язвы бывают покрыты клейкою песочною или былою слизью, и от одной ко другой части распространяются. Она распознается по преждебывшим от любострастным бользненным припадкамь.

Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія, и внъшняго ртутьнаго полосканья.

2) Молочница от воздоен за сосцами любострастной кормилицы. Сей видь молочницы весьма часто примъчается въ младенцахъ воспитуемыхъ любострастною кормилицею; и, какъ я самъ видалъ, от однихъ поцалуевъ таковой кормилицы, дътямъ приключаются любострастныя язвы на губкахъ.

Врачеванте таковых в дътей требуеть ртупьнаго сиропа. А внъ должно полоскать роть ртупьным раствором в смъщенным со ртупьным в медом в или сиропом в.

TAABA BTOPAR.

О любострастных в язвах в нюба.

- 1. Язвы любострастныя случаются вы нюбь или поднебенью оты любострастнаго яда.
 - 2. Виды оныхъ суть сїи:
- 1) Язвы простыя. Онт начинаются сперьва красным пятном, нт сколько возвышенным, которое мало помалу превращается вы тнюсную язву, и часто разытаеть нюбныя кости костетациею.

Врачеваніе внутреннее требуеть ртутьнаго бальсамическаго раствора смътеннаго сь розовымь медомь, и внутренняго камединной ртути употребленія.

2) Язвы раздъдающія насквозь нібо. Иногда костетдица раздъдаеть нібоныя кости даже до самой носовой впадины; въ такомъ случать съ превеликимъ омератніемъ часть пищи и питія во время поглощенія, выпадающь въ ноздри, и по томъ вонъ изъ оныхъ.

Врачеваніе, кромъ внутренняго камединной ртупи употребленія, требуеть еще и того, чтобь оныя язвы ежедневно по нъсколько разь кисточкою смазываемы были бальсамическимь ртупьнымь растворомь смъ-

шан-

шанным съ медом или чтобъ грецкая губа оною ессенциею напоенная, посредством в нюбнаго купора, къ костевдному отверстию прикладываема была.

TAABA TPETEN.

О тесоткъ любострастной подбородка.

Чесопка любострастная струпная, отв любострастнаго яда раждающаяся, обвемлеть всю окружность подбородка.

Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія, и внъшняго прикладыванія известковой ртутьной воды.

отд Блен ІЕ ХІІ.

О любострастныхъ бользняхъ выйныхъ и горпанныхъ.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О любострастных зобах выйных в.

- 1. Любострастные выйные зобы, или желваки, суть затвердълыя окръплости подчелюстных выйных выйных жельзв, на самой выи случающіяся.
 - 2. Виды оныхъ сушь сїи:
- 1) Любострастные выйные зобы от повсюдной заразы. Они познаются по суще-Е 5 ству-

ствующимы другимы любострастнымы бользнямы, и по большой части токмо слегка воспаляются. Иногда только одины, а иногда многе зобы вмысть случаются. Рыдко оны разбиваются, а большею частью премыняются вы долговременныя язвы выйныя.

Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія, и внъшняго прикладыванія раствора ртутьнаго съ соннымь зъльемь смъщеннаго.

2) Любострастные выйные зобы от скрытной заразы. Младенцы, коих родители прежде любострастной бользни подвержены были, так же и ть дьти, у коих струпья на головь несовершенно льчатся, достигши совершенныйшаго возраста, страждуть таковыми зобами.

Для внутренняго врачеванія оных вобов в похваляются камединная ртуть, мореная ртуть, и минеральный евіоп или сфрнортутьный состав св сонным зельем в смъщенный.

TAABA BTOPAA.

О любострастной жабь.

1. Любострастная жаба есть трудное и еБ болью сопряженное глотание причиненное любо-

любострастным в ядом в засёдшим около гортани. Никакіе болёзненные любострастные припадки столь часто не усматриваются, как в пятна и язвы гортанныя.

- 2. Виды сея бользни сушь сїи:
- т) Жаба воспалительная. Познается пятнами красными и широкими, кои претворяются въ малыя язвы, на поверхности зримыя, или въ любострастную молочницу.

Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія и простыхь лъкарствь, вожженію сопротивляющихся; и внышняго полосканья ртутьнаго.

2) Жаба съ язвами сопряженная. Познается по язвамъ песочнымъ, гнюснымъ, сальнымъ, широкимъ, около воздушной и пищеприемной трубы, такъ же около язычка, миндалинъ и ніобной преграды распространяющимся; а при томъ хрипливымъ и сквозъносъ произносимымъ голосомъ; и на конецъ смердящимъ, и клейкомокротнымъ слинотеченіемъ.

Врачеваніе состоить вы томь, чтобы внутренно давать камединную ртуть и взвары сарсапарели; а вны употреблять ртутьное полосканье.

de orsundose see orsun

- 3) Жаба застарълая или укоренълая. Въ семъ видъ, язвы либо въ рака перемъняются, либо тъла выйныхъ позвонковъ костеъдицею испорчены бывають. Смазыванте гортани ртутью растворенною въ жидкомъ усыпительномъ составъ и въ ессенцти смирны иногда и въ семъ случаъ мнъ благоуспъшно было.
- 4) Жаба от испорченнаго глотанія любострастнаго. Распознается по ощущенію препятствія или опухоли внутрь пищепріємной трубы, власно как вы неподвижно пребывающих в, и по преждебывшим в или еще существующим влюбострастной бользни знакам в.

Врачеваніе требуеть камединной ртути. Но тяжелое глотаніе происходящее от чрезмітьной чувствительности горшани, и по совершенном исціленій язві продолжающееся, со временем само собою проходить.

отд Бленге XIII.

О костныхълюбострастныхъбользняхъ.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О любострастной костной олухоли.

1. Любострастная костная опухоль есть мъстное кости возвышенте, от любострастнаго яда засъдшаго въ костномъ существъ.

- 2. Костная опухоль твержъ самой кости бывающая, костнымь наращениемь; а весьма мягкая гуммою любострастною называются.
- 3. Причина ближайшая сего есть возвышение костных в бляшекв, или надкостной оболочки, отв любострастной клейкой слизи, подвоными частьми разлившейся.
- 4. Мъсто или съдалище костных опухолей есть головный черепь, ключица, грудинная кость, локотная и голенныя кости.
 - 5. Косшная опухоль просшая познается по опухоли глубокой, неподвижной, плоской, едва мягшей ошь самой кости, большею частью округлой, съ кожею одноцвътной, и по большой части болящей такь, что боль вь самой кости ощущается.

Разогнаніе оной опухоли требуеть внутренняго камединной ртути употребленія и взвара сарсапарели купно съ корнемъ волчьяго перца.

6. Костная опухоль костевдная познается по преждебывшему воспалентю и послъдствующему отдълентю и уязвлентю мягких в частей.

Врачеваніе требуеть обнаженія болящаго мъста и прикладыванія раствора сулемы купно сь ессенціею смирны.

TAABA BTOPAN.

О костномъ наростъ или наращении любострастномъ.

- 1. Костное любострастное наращение есть опухоль на всей конечности длинной кости бывающая, и засъдшая въ ноздреватомъ костномъ существъ отъ любострастнаго яда.
 - 2. Виды онаго супь сіи:
- 1) Косшное наращение простое познается по опухоли цълой костной конечности. Ко-гда оно еще не давно случилось, и еще не имъ-етъ костяной твердости; тогда разгоняется разно какъ и костная опухоль. Въ про-тивномъ же случать отнюдъ не разръшается.

Внутренное употребление осаженной былой ртути, ежедневно по одному грану внутры принимаемой, вы сей бользни похваляется.

2) Костное наращение костевдное. Познается по знакамъ костной опухоли, въ язву открывшейся.

Врачеваніе, кром'в внутренняго камединной ртути употребленія, требуеть еще и глубокато просверливанія кости тніючей, дабы мозговый сокь могь вонь вытекать. Когда костевый суже объемлеть всю конечность кости; вы такомы случать нать другаго средства, кром'в отнятія оной.

ГЛАВА

TAABA TPETBA.

О костев дицв любострастной.

- 1. Костевдица любострастная есть порча кости на внъшней ея поверхности, отъ любострастнаго яда бывающая.
- 2. Мъсто, или частъйшее оной съдалище, бываеть въ носовой впадинъ, въ головномъ черепъ, грудинной кости, локтъ, и голенъ.
 - 3. Виды оной суть сіи:
- 1) Костевдица мъстная есть та, которая занимаеть токмо одно мъсто на кости. Она большею частью раждается от преждебывшаго воспалентя надкостной перепонки, такъ же от костной опухоли, или от туммы превращающейся въ возгноенте; не ръдко от закожной язвы, самую кость разъвлающей случается. Врачеванте требуеть внъшняго прикладывантя ртутьнаго бальсамическаго раствора купно съ розовымъ медомъ; и внутреннято употреблентя камединной ртути купно съ дурнымъ духомъ, взваромъ сарсапарели и волчьяго корня.
- 2) Косшевдица повсюдная есть гниль костная обвемлющая почти всю поверхность одной или многих в костей. Познается по тому, что на многих в мъстах в мягкія ча-

сти покрывающія гніючую кость, язвами поражающся.

Врачеваніе нужно испытывать то же, что и вы первомы видь; однакожы оно ръдко удается вы повсюдной костетиць; по тому что сія по большой части изсущеніемы соковы болящаго убиваеты.

TAABA YETBEPTAR.

О любострастной внутръкостной гнили.

- 1. Любострастная внутрькостная гниль ссть порча начинающаяся внутри въ самомъ костномъ мозгъ, и оттуда внъ кости распространяющаяся.
- 2. Сія бользнь часто случается у дътей рожденных вот любострастных родителей. Гниль внутрькостная у взрослых людей случающаяся почти всегда есть любострастная.
- 3. Она по большой части поражаеть кости ручныя и ножныя, такь же и конечности длинныхь костей.
- 4. Гниль внутрькостная новоначинающаяся познается по боли глубокой въ самой кости ощущаемой, долговременно продолжающейся, на послъдокъ по краснъющей и вспухающей внъшней кожъ покрывающей кость, костеъдицею пораженную. 5.

5. Гниль внушрькосшная явная или ошкрышая. Пораженная часть на послъдокъ получаеть опухоль краснъющую и ноздреватую, многими дирами зіяющую и язвами покрытую.

Врачеваніе состоить вы томь, чтобь внутренно давать камединную, или мореную ртуть купно сы дурнымы духомы и взваромы лихорадочной корки, волчьяго корня, омега и сарсапарели; а вны кы язвамы прикладывать ессенцію мастики купно сы сулемою и розовымы медомы, и по томы еще сы верьху прикрывать опухоль неаполитанскою мазью. Я симы образомы уврачевалы многихы болящихы.

I.AABA ПЯТАЯ

О любострастной мягкости костей.

1. Любострастная мягкость костей есть гибкость оныхв, любострастнымь ядомь причиненная.

2. Мягкость костей мъстная. Иногда найболье смягчается одно мъсто на кости подобно воску, какъ то въ костныхъ омухоляхъ видъть можно. Врачевание совершается равно какъ и въ костныхъ опухоляхъ.

- 3. Мягкость костей повсюдная, многія или всь вивсть кости заражающая.
- 4. Знаки повсюдной мягкосши сущь сти: рость или стань тьла посль преждебывшей боли вы костяхы умаляется; болящти не можеть стоять на ногахы; моча бываеть сы известковою осадкою и мушная; кости накривляются; кости кривыя легко выправленны быть могуть: однакожы и легко предомляются.

Таковая бользнь есшь неисцылимая. Ни ртупьныя мази, ни прошивущынготные соки, ни солодовой взварь, ниже маріона не пользовали.

TAABA III ECTAA.

О любострастной ломкости костей.

- 1. Ломкость любострастная костей есть такое расположение оныхъ, когда онъ отъ самомалъйшей причины преломляются.
- 2. Сїя бользнь бываешь мьсшная, или повсюдная и общая.
- 3. Ломкость от мягкости костей познается по тому, когда кость сама собою или легко накривляется. Преломление размягченной кости есть неизлъчимо.

- 4. Преломленіе или переломо отб любостраєтной сухоты во костяхо. Такое преломленіе кости познается по тому, когда отб самой маловажной причины, случается хотя гибкость кости при томо не бываеть. Врачеваніе таковаго перелома тако же есть не возможно.
- 5. Перелом от любострастной костефлицы; ибо таковая костефлица развыдающая внутреннее существо кости легко может причинить перелом кости вы том самом мъстъ, которое поражено костефлицею.

Таковый перелом врачеван быть не можеть, развъ прежде мьсто кости гніючей оть гнилости бляшками очистится.

отд Бленіе XIII.

О любострастныхъ бользняхъ членосо-единеній.

TAABA HEPBAR.

О опухолях в сленовных в любострастных в.

1. Опухоли членовныя любострастныя бывають подобны сумочнымь или пузырчатымь, вь разныхь мъстахь около членосоединентй, любострастною бользнтю зараженныхь, приключающтяся. 2. Опухоли пузырчашыя не любострастныя бывають хладнаго свойства и отнюдь не подвергаются воспалентямь и нагноентямь. Но опухоли пузырчатыя любострастныя бывають сопряжены со внезапнымь и скоро преходящимь жаромь, краскою и перемъжающеюся болью.

Такъ же часто примъчено и то, что многія таковыя опухоли совокупно являются.

- 3. Членовныя опухоли разняшся от костной гуммы своею движимостію; иногда от явной или повсюдной, а иногда от скрытной заразы раждаются равно как и ячменець на очных въках в.
- 4. Врачеваніе шребуеть внутренняго камединной ртути употребленія, и взвара лькарственных в деревь, или сарсапарели сь коркою волчьяго перца, и внъшняго прикладыванія раствора сулемы и ртутьной мази.

TAABA BTOPAR.

О соращении тленовъ любострастномъ.

- 1. Любострастное членовъ соращение есть недвижимость оныхъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.
 - 2. Виды онаго сушь слъдующіе:
- 1) Соращение членовъ отъ костнаго нароста. Познается чрезъ прикосновение самой

костной конечности вспухшей. Зри костное наращение.

2) Соращение членовь от членовнаго сока стустившагося. Опухоль членовная бываеть круглье; хотя воспалительная и болящая опухоль вы членосоединении не предшествуеть.

Врачеванте требуеть внутренняго камединной ртути употреблентя и взвара лькарственныхь деревь или волчьяго корня, такь же внытняго прикладывантя ртутьнаго раствора, на подобте тепловатой примочки, или ртутьной мази купно съ аммонтаковою камедью.

3) Соращение членовь от воспаления связокь. Опухоль при своемь началь бываеть весьма болящая и ночью нысколько красныющая или рабющая.

Врачеваніе требуеть вы первомы воспалительномы времени камединной ртути купно сы емульсією селитреною и проноснымы, воспаленію сопротивляющимся; и внышняго употребленія меда мужескаго корня купно сы неаполитанскою мазью. Иногда и ртутьный растворы вны приложенный воспользоваль.

отдъление хіу.

О любострастных вользнях женскаго пола, и вопервых о бользнях дътородных частей женских.

TAABA HEPBBAA.

0 былой грыжы или тегеніп были любост-

- 1. Бълая грыжа любострастная есть теченте гноеватой клейкой слизи изъ рукава машки, причиненное любострастнымь ядомь.
- 2. Бълая грыжа у женъ большею частью пртобрътается чрезъ плотское совокупленте съ мущиною зараженнымъ сею же бользнтю; не столь часто оная случается отъ воздоентя любострастнаго младенца, или по наслъдству.
- 3. Знаки, по коимъ бълая грыжа любострастная отъ бъли простой разнится, суть сти: 1) Внезапное нашествте оной въ первой или на другой день послъ нечистаго соиття. Обыкновенная бъль медлънно начинается. 2) Жигучтй жаръ въ рукавъ матки ощущаемый или трудное мочетеченте, часто съ недавнею бълою грыжею сопряжены бывають. Бъль простая бываеть безъ боли, развъ будеть за-

корентлая. 3) Пупырышки или пузырки зудящіе, или малыя язвы гнойныя на молочницу похожія, въ самомь рукавть машки гнтздящіяся, бывають сопряжены съ бълою грыжею любострастною недолго продолжающеюся; ибо язвы гнойныя токмо съ бълью обыкновенною и уже весьма застартою купно случаются. 4) Мокрота гноеватая, желто-зеленоватая изъ рукава матки истекающая; которая въ обыкновенной бъли бываеть токмо клейкою возгривою, или бъловатою. 5) Зараженте мущины здороваго бълою грыжею любострастною; что есть достовтритьтимъ знакомъ.

- 4. Виды различій бълой грыжи суть сіи: простая, сложенная и застарълая.
- 1) Бѣдая грыжа просшая есшь ша, кошорая обръщается въ желѣзахъ слизоточащихъ, кои нижнюю окружность рукава матки объемлють. Познается по истеченти гноеватой клейкой слизи или рукава матки.

Сей видь по большой части начинается безь запора мочи, но сь легкимь жаромь и зудомь вы рукавы матки ощущаемыми; долговременно продолжается; на послыдокы истекающая влага бываеть совершенно клей-

кою слизью, и мало помалу, однакожь нескоро, совсъмъ перестаеть.

Бълая грыжа у женъ по причинъ безпрерывной влажности рукава матки, труднъе врачуется и долъе продолжается, чъмъ у мущинъ.

Врачеваніе требуеть і) порошка легко слабительнаго, 2) взвара корня лапушникова; которой вы первыя седмицы внутренно употреблять должно; по томы 3) тогожы порошка легкослабительнаго купно сы немногими каплями копайскаго бальсама; и на послыдокь 4) впрыскиванья состоящаго изы ртутьнаго раствора, по 4 раза вы сутки повторяемаго.

2) Бълая грыжа сложенная есть та, которая съ воспаленіемъ мочеиспускащельнаго ствола, или устья онаго, или Санкторіевой жельзы сопряжена бываеть. Познается зрыніемъ краски въ воспаленномъ мъсть: истеченіемъ гноеватой мокроты изъ устья мочеиспускательнаго ствола; или возвышеннымъ бугоркомъ воспаленнымъ Санкторіевой жельзы, по бокамъ мышицы, которая рукавъ матки сожимаеть, лежащей: и на конець труднымъ мочетеченіемъ, во время испусканія мочи и посль онаго бывающимъ. ющимъ. Въ то жъ самое время и ощущенте нъкотораго тъла, изв рукава матки низпадающаго, чувствуется.

Врачевание съ начала требуется воспаленію сопрошивляющееся купно со камединною ртутью, равно какв и во время продолженія былой грыжи воспалишельной. По прошесшвій же онаго времени должно употребить врачевание былой грыжь гнойной приличное, и продолжать впрыскиванья ртутьныя.

Бълая грыжа сопряженная съ малыми язвами, пупырышками зудящими, опухолями задняго прохода, или съ другими болъзньми. должна бышь врачуема таким образомь, какЪ оныя бользни того особо требують.

3) Бълая грыжа засшарълая или укоренълая есть та, которая уже нъсколько мъсяцей, или больше года прололжается. Причиною оной есшь бездъйственность жельзокЪ, клейкую слизь опідъляющихъ въ рукавъ машки, или язва въ самой машкъ, или въ окружности ея рукава обрътающаяся.

Виды оной сушь слъдующіе:

а) Бѣлая грыжа застарѣлая клейкомокротная. Познается по истеченію клейкой и тонкой слизи негноеватой, и по тому, что бъль Ж 5

мъсшная въ машкъ, или въ ея рукавъ не бы-

Врачеваніе требуеть внутреннихь лькарствь крыштельныхь, какь то винограднаго вина крыштельнаго настояннаго сь лихорадочною и винтеровою коркою, такь же сь листами толокнянки и сталью или жельзными опилками, а вны пользуеть впрыскиванье купоросной или холодной воды, и холодная водяная купьль.

b) Бълая грыжа застарълая съ язвами сопряженная. Познается по истеченію сукровицы гноеватой, по мъстной боли, и чрезъ перстное испытаніе. Бълая грыжа отъ язвъматки происходящая, и вяжущими лъкарствами вскоръ прекращенная, премъняется въ воздушноводяную бользнь.

Врачеваніе бѣлой грыжи, сЪ язвами сопряженной, пребуешЪ пого, чтобЪ исцѣлить язву вЪ машкѣ или ея рукавѣ сокрывающуюся; о чемЪ зри язвы машки и ея рукава.

TAABA BTOPAS.

О вослаленіи любострастномь, Автородных в женских в тастей.

т. Воспаление любострастное бываеть вы самомы устью, или рукавы матки; и иногда сы былою трыжею, а иногда безы оной случается.

2.

2. Воспаленте устья рукава матки есть опухоль губокь дътороднаго уда женскаго и устья рукава машки. Оно познаешся зръніемь, по жару вь дъпородномь женскомь удь, и по трудному мочетеченію, при испусканіи урины ощущаемыми.

Врачеваніе пребуеть легких в проносных в, кровопускантя, если воспаленте есть великое, также емульсти прохладительной купно съ камединною ршушью; а вив должно упошребляшь ршушьное молоко или водяной растворь мореной отупи, въ видъ тепловатой примочки.

Иногда одна, или объ губки дътороднато уда женскаго возгнояющся, и гной оштуда исшекаешь чрезь многія отверстія; въ шакомъ случав должно внъ прикладывашь ршушьную мазь смъщенную св пласшыремв діахильнымь.

3. Воспаление Санкшориевой жельзы познается по бугорку воспалительному, по сторонамъ устья рукава машки обрътающемуся, по сильному зуду и жару, въ рукавъ машки ощущаемыми.

Врачевание есшь то жъ самое, что и въ первомъ видъ.

4. Воспаление рукава машки есть жигу-NIP 108 затвердълость дът. ж. частей.

чій жарь вы самомы рукавь машки ощущаемый, иногда чрезы многіе мьсяцы сряду продолжающійся, ръдко безы язвы, часто и безы былой грыжи случающійся.

Врачевание есшь то же самое, что и въ са-

IAABA TPETBA.

дъторо дных в састей.

- 1. Зашвердълость любострастная дътороднаго женскаго уда по большей части раждается от прежде бывшаго воспаленія, и от сильных вяжущих в лъкарствь, в врукав матки насосцом впрыскиванных в.
- 2. Запвердълость устья рукава машки, есть окрыплость дытородных женских устье рукава машки, губок устье рукава машки, от таковой окрыплости весьма сожатое обрытается.
- 3. Зашвердълость бугроватая. Бугорокъ одинъ или многія въ самомъ устью рукава матки, или въ губкахъ дътородныхъ женскихъ перстами ощупываются. Иногда и весь рукавъ матки таковыми жъ но меньшими бугорками наполняется.

Таковые бугорки застаръвши, иногда превращаются въ весьма худыя язвы рака.

4. Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія купно съ соннымь зельемь. А внѣ должно прикладывать тепловатую примочку состоящую изъ взвара листовь омега и изъртути съ соннымь зельемь смѣшенной, а къ ночи ртутьной мази.

TAABA YETBEPTAN.

О любострастных в язвах детороднаго женскаго уда.

- 1. Любострастныя язвы, въ дътородномъ женскомъ удъ случающияся, отъ Французовъ шанкромъ называются.
 - 2. Виды оныхъ сушь сїи:
- 1) Язвы на молочницу схожія начинаются от пупырышков зудящих водим от в крысталовидных в пузырьков води на посльдок в премыняются в в малыя язвы, на поверхности разсыянныя, цвытом в пьсочныя или быловатыя.

Онъ легко врачуются чрезъ частое мытье дътородного уда женскаго, посредствомъ ртутьнаго бальсамическаго раствора.

2) Язвы распространяющіяся. Начинаются оть пятна широкаго краснаго или оть бугорка воспалишельнаго, въ малыхъ дътородныхъ губкахъ, или въ Санкторїевой желъзъ случающагося: весьма болять: и безпрерывно кругомъ распространяются такъ, что мало помалу разъвдають и меньшія тубки, и поточку, и все устье рукава матки, а особливо если въ скоромъ времени порядочное врачеваніе унотреблено не будеть.

Врачеваніе пребуеть внутренняго ртути унотребленія и внышняго прикладыванія ртушьнаго раствора, купно съ соннымь зельемь и розовымь медомь или съ ессенцією мастики смышеннымь.

3) Язвы въ рака претворяющіяся; раждаются от окрылыхь и затвердълыхь бугорковь, въ дътородномь женскомь удъ случающихся, весьма болять, вскоръ въ окружности распространяются, и трудно врачуются, а иногда премъняются въ настоящаго любострастнаго рака.

Врачевание шребуеть того, чтобь внутренно давать камединную ртуть и сонное зелье; а внъ прикладывать насыщенной растворь ртутьной бальсамической.

of out dening manager of the so

язвы рукава машки.

I.AABA II ATAA.

О мобострастных в язвах в рукава матки.

- 1. Любострастныя язвы случаются въ самомъ рукает матки, и бывають различнаго свойства.
- 2. Язвы простыя, суть малыя, на внутренией поверхности рукава машки нѣсколько распространяющіяся, и не много болящія; а познаются по истеченію гноя, и по мѣстной боли ощущаемой во время перстнаго испытанія.

Врачевание совершается посредством внутренняго камединной ршути употребления, и впрыскиванья бальсамической ршути.

3. Язвы далеко распространяющіяся. Онѣ бывають весьма болящія; по тому, что вь то жь время и воспаленіе объемлеть всю окружность язвы, и поверхность рукава матки вь разныхь мъстахь покрывается тръщинами, изь коихь преострая гнойная сукровица беспрестанно истекаеть.

Врачеваніе пребуеть внутренняго ртути употребленія купно съ соннымь зельемь; и внъшняго впрыскиванья вышше сего объявленнаго.

phoneurane el rosenciosermententi enconfi

4. Язвы сокрышыя. Иногда язвы въ вержией части рукава матки гнъздятся, весьма мало болять, и не много сукровицы изъ себя источають. Таковыя язвы не причиняють ни какого примътнаго припадка, которымь бы быте оныхъ означалось; ибо ни боль, ни трудность при испусканти мочи не примъчаются; а легкая боль рукава матки, во время плотскаго совокуплентя, или при перстномь испытанти ощущаемая въ самомъ уязвленномь мъсть, приписывается совсъмъ другимъ и самымъ безвиннымъ причинамъ.

И по тому таковая женщина можеть быть зараженною, которая по прилъжномь испытанти и осмотрънти казалась быть здоровою, и которая даже и сама о себъ не знала того, что она есть заражена; по тому то иногда самые мущины зара каются бълою грыжею или язвою, на плъшкъ дътороднаго уда оказывающеюся, отъ таковой женщины, которая совершенно здоровою быть являлась.

Врачеванте должно бышь прилагаемо то жъ самое, что и въ первомъ видъ.

4. Язвы мочеваго пузыря, из рукава машки въ мочеиспускательной стволь, или въ мочевой пузырь проницающія. Когда онъ токмо проницають въ мочеиспускательной стволь, въ такомъ случав моча, токмо при испускани оной, вытекаеть въ рукавъ матки; когда жъ язва разъвдаетъ и самую шейку или внутренность мочеваго пузыря, въ такомъ случав моча безпрестанно каплями истекаеть въ рукавъ матки.

Врачеванте при перьвомъ случав бываеть легчв, а во второмь многотрудно. Свъчу маленькую внутри пустую, ртутьною мазью смазанную, должно впускать вы мочеиспускательной стволь, или вы самую впадину мочеваго пузыря; а вы рукавы матки насосцомы впрыскивать ртутьной составы.

5. Язвы заднепроходныя суть тв, кои изв рукава матки проницають вы заднюю кишку, такь, что нечистота низомы испражняемая, хотя вы прочемы и жидкая, чрезы рукавы матки воны испражняется.

Врачеванте оных весть многотрудное; однакож вожно впрыскивать ртутьной составь вы рукавы машки, и запускать туда жы широковатую трубочку изы маленькой свычи составленную, дабы нечистота низомы испражияемая оты задней кишки отводима была. Симы образомы исцыленте язвы скорые постышествуется.

114 прекращение кровотечения.

отд Бленге хуг.

О любострастных в бользняхь матки.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О прекращении кроеотегения любострастномв.

- 1. Прекращение обыкновеннаго мъсячнаго кровошечения ошь любосшрасшнаго яда приключаешся.
- 2. Прекращение мъсячнаго кровошечения от бъли происходящее. Я видълъ премнотихъ женъ, бълью любострастною страждущихъ, кои уже больше года отнюдъ не имъли мъсячнаго кровошечения. Всъмъ таковымъ камединная ртуть, чрезъ нъсколько мъсяцовъ сряду данная, легко и въ скоромъ времени произвела обыкновенное кровоочищение.
- 3. Прекращение мъсячнаго кровошечения от повсюдной любострастной бользни. Иногда и безь бъли мъсячное кровошечение остановляется от того, когда любострастный ядь заражаеть всю кровь, или причиняеть захряслость вы маткъ.

Врачеваніе требуеть камединной ртути употребленія.

TAABA BTOPAN.

О любострастномь уязвлении матки.

- 1. Любострасшное уязвление машки есть язвы случающияся на внутренной ея поверхности, или на ея рыльцъ, по большой части послъ бълой грыжи застарълой.
- 2. Язвы на всей внутренной поверхности машки, любострастным в ядомы причиненныя суть сіи: жары вы самой маткы и около ея ощущаемый, быль гноеватая, трудное мочетеченіе, безпрерывный позывы кы испусканію мочи, изсушеніе всего тыла, и медлынная лихорадка.

Врачеваніе по большей части бываеть тщетное, или многопрудное; однакожь оно требуеть внутренняго камединной ртути употребленія, купно съ соннымь зельемь и взваромь насыщеннымь сарсапарели и съ молокомь; а внышняго впрыскиванья состоящаго изъртути и соннаго зелья, не токмо въ рукавь матки, но и въ самую впадину матки, посредствомь способнаго орудія.

3. Язвы устья или рыльца матки. Болъзненные припадки бывающь тъ жъ самые, но легчъ. Перстомь можно ощупывать устье 116 воздушноводяная бользнь машки.

или рыльце машки разорванное, или раздранное и язвами покрышое.

Врачевание оныхъ що жъ самое испыты-вать должно.

IAABA TPETBA.

О воз душно-во дяной любострастной бользни матки.

- 1. Воздушно-водяная бользнь есть опухоль машки, происходящая от воздуха и тноеватых в мокротв, внутреннюю впадину машки разширяющих в. Она по большей части приключается посль долговременных в язвъ бывших в в машкъ.
- 2. Воздушно водяная бользнь машки отб сростшагося рыльца машки. По предшествии знаковь бывающихы при уязвлении машки, раждается вы самой машкы и около ея опухоль вы подчеревной части, постоянная, круглая, упругая и равная: а при томы никакой трескы, или внезапное гноеватой влаги истечение не примъчаются.

Врачеванія совершеннаго, по причинъ рыльца машки сросшшагося, ожидать не должно.

3. Воздушно водяная бользнь ошь рыльца машки заваленнаго. По предшестви знаковь изьявляющихь машку уязвленную, машка машка внезапно пухаеть, какь и вы первомы видь; но иногда вы тожь время внезапно истекаеть гноеватая и острая влага купно сы трескомы рукава матки, или со смердящимы воздухомы, изы онаго рукава сы великою силою воны исходящимы, послы чего опухоль матки преждебывшая нысколько умаляется.

Врачеваніе есть многотрудно и недостовърно. Вы прочемы однакожы должно давать внутренно камединную ртуть, купно сы насыщеннымы взваромы сарсапарели; а внъ стараться о томы, дабы рыльце матки всегда было отверсто, чтобы острая мокрота изы впадины матки свободно воны истекала, и впрыскиванья ртутьныя внутрь оной вливаемы быть могли.

отдъление хун.

О любострастныхъ бользияхъ сосцовъ.

ГЛАВА ПЕРВАЯ.

О любострастномъ вослалении сосцовъ

1. Любострастное воспаление сосцовь есть воспалительная опухоль оныхъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.

- 2. Воспаление сосочка. Оно раждается большею частью от воздоения младенца любострастным в ядом вараженнаго. Кожа около сосочка вспухающая, совершенно его закрывает в.
- 3. Воспаленіе жельзокь. Сперьва раждается бугорокь глубоко простирающійся, жигучій, твердый, паховику паховому подобный. Трудно разбивается, и трудно вы возгноеніе приводится. Иногда при томы и подкрылошная жельза вмысть затвердылою дылается.

Врачеваніе требуеть внутренняго ртути употребленія; а внъ должно прикладывать тепловатую примочку состоящую изь раствора ртутьнаго и изь смягчительных порошковь, или припарку разбивающую, съ прибавкою къ ней бълаго пшеничнаго хлъба.

Если разогнаніе будеть неудачно, вы такомы случать должно стараться произвести возгноеніе, и поступать такимы образомы, какы и при врачеваніи обыкновеннаго паховика.

IAABA BTOPAN.

О любострастных взвах всосцовь.

1. Любострастная язва въ сосцахъ раждается отъ любострастнаго яда.

- 2. Язва сосочка, шанкромъ именуемая. Большею частью приключается от сосанія младенца любострастнаго, или от высасыванія млека женщиною любострастною. Она объемлеть только сосочекь, или вмъсть и весь онаго кружечекъ.
- 3. Язва закожная. Она разывдаеть и кожу, и поды оною обрышающійся жиры, и далече вы окружности распространяется; а раждается сперыва оты широкаго пятна любострастнаго, повсюдною, или сокрышою заразою причиненнаго.

Врачеваніе требуеть кромъ внутренняго камединной ртути употребленія, еще и внъшняго прикладыванія ртутьнаго бальсама, или ртутьнаго бальсамическаго раствора.

TAABA TPETBA.

О любострастном в рак в сосцов в.

- 1. Любострастный ракъ сосцовъ есть спухоль твердая, жестоко болящая, и безцвътная, въ одномъ или въ объихъ сосцахъ, любострастнымъ ядомъ причиненная.
- 2. Ракъ любострастный различится отъ настоящаго рака слъдующими знаками: 1) настоящій ракъ большею частью медльню, а любострастный скоро нарастаеть. 2) Твер-

равно какв и вв воспалищельной опухоли, и не глубока. 3) Гной вв любострастномв ракв бываеть ракв бываеть желтозеленоватый; а вв настоящемь на сукровицу похожій, красноватый. 4) Ракв настоящій отв ршути ожесточается, а любострастный оною исцъляется.

3. Ракъ сосцовъ запвердълый и окръплый есть опухоль твердоватая, жестоко болящая, безцвътная, закрытая, или въ язву премънившаяся.

Врачеваніе требуеть внутренняго камединной ртути употребленія купно съ соннымь зельемь и взваромь сарсапарели; и внъшняго прикладыванія ртутьнаго пластыря и раствора. Если врачеваніе будеть неудачно: вь такомь случат ракомь пораженный сосець совстмь отнять должно.

4. Ракъ грибованый или ноздреваный, есть опухоль ноздреваная, на грибъ похожая, жестоко болящая, любострастнымъ ядомъ причиненная.

Врачеванте требуеть камединной ртути употреблентя, купно со взваромь сарсапарели; или когда все вышепоказанное есть безуствино: въ такомъ случат опую онухоль искусствомъ отнять должно.

5.

5. Рак'ь съ антоновымь огнемь сопряженный, или любострастная нома, есть язва любострастнымь бользнямь и антоновому огню свойственная. Она познается по красножелтоватому бугорку, который въ скоромь времени премъняется въ язву весьма глубокую, антоновымь огнемь пораженную, по краямь красножелтоватую, весьма смердящую и болящую.

Врачеваніе требуеть, чтобь внутренно употреблять камединную ртуть, купно сь коркою лихорадочною; а внъ растворь сулемы водочный, или мореная ртуть, посредствомь нащипанной пряжи прикладываемыя, приносять пользу.

Конецъ перьвой части.

CARON ANDORE : MORIORP CRIST

THE CHOICE TOWN

YACT B BTOPAS.

O внутренныхъ любоспірастныхъ бользняхъ.

отд Бленіе і.

О любострастныхъ лихорадкахъ.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О любострастной простой лихорадкв.

- 1. Любострастная простая лихорадка есть повседневная трясучка, или жестокая горячка, любострастнымь ядомь причиненная.
- 2. Она иногда вскоръ послъ нечистато совокупленія, безъ всякой заразы дътородныхъ частей; иногда послъ изчезнувшихъ паховиковъ, или по прекращеніи бълой грыжи начинается. Иногда чрезъ 20, 30, или и больше, сутокъ продолжается; а иногда по прошествій не многихъ дней снова прекращается.
- 3. Сїя лихорадка означается четверакимь образомь: 1) потомь изобильнымь и смердящимь. 2) Мочею мутною и изобильною вонючею и жигучею. 3) Бълою грыжею, или теченїемь бъли снова возвращающимся.

- 4) Низложентемь любострастнаго вещества во перьвыхь по самой кожи: оты чего пупырышки былые, пшенному сымени подобные, пяшна желтые, и прочтя закожныя бользни; а во вторыхь ко внутренностямь: оты чего боль жигучая, долговременная вы разныхы внутренностяхь; а вы третьихы кы частямы мышечнымы: оты чего ломота, ломы вы составахы и боль вы головы, послы любострастной лихорадки приключаются.
- 4. Врачеваніе сея лихорадки требуеть:

 1) кровопусканія, если жестокая лихорадка или многокровіе примъчаются; 2) проноснато лъкарства воспаленію сопротивляющагося; 3) емульсій или оршада прохладительнаго; 4) взвара насыщеннаго сарсапарели и пасліона; и 5) пилюль составленных в извимединной ртупи.

TAABA BTOPAR.

0 вослалительной любострастной лихо-

- 1. Воспалишельная любострастная лихорадка есть жестокая горячка, съ любострастными воспалентями сопряженная.
- 2. Она примъчается во время воспалительной бълой грыжи, при вожжении яичекъ, крайней

крайней плоти, предстательной жельзы, и паховых в жельзы; также вы случаь окобольнія, былою грыжею причиненнаго, и воспаленія гортани.

- 3. Она начинается съ воспалентемъ, а по окончанти онаго оканчивается; и всегда ночью примъчается сильнъе.
- 4. Врачеванте требуеть кровопускантя, взвара сарсапарели купно съ селитрою и камединною ртутью.

TAABA TPETSA.

О любострастной медлиной лихорадки.

- 1. Любострастная медленная лихорадка бываеть малая но долговременная, съ любострастнымь изсущениемь тела сопряженная.
- 2. Она раждаешся ощь язвы скрышной или явной, коея гной всасываешся кровоносными сосудами.
- 3. Врачеваніе шребуеть исцыленія язвы. Зри чахотка любострастная.

TAABA YETBEPTAA.

0 любострастной желтной лихорадкв.

1. Любострастная желчная лихорадка есть трясучка, имъющая свое пачало отъ желчныхъ нечистотъ обременяющихъ чревныя

ныя внутренности, любострастным людям васто приключающаяся.

- 2. Желчная лихорадка есть не собственная, но припадочная любострастной бользни.
- 3. Она познается по нечистоть языка, по отвращению от пищи, и по желчночу расположению.
- 4 Врачеваніе требуєть сперьва рвотныхь и слабительныхь лькарствь, а по томь истребляющихь желчныя мокроты, какь то тамариндоваго сока, купно сь перечищеннымь виннымь камнемь.

ГААВА ПЯТАЯ.

Олюбострастной перемвжающейся лихора дкв.

- 1. Любострастная перемъжающаяся лихорадка бываеть повседневная, придневная, или чешверодневная, оть любострастнаго яда происходящая.
- 2. Перемъжающаяся лихорадка самородная есшь та, которая раждается от самаго любострастнаго яда. Она отнюдь не прогоняется лихорадочною коркою, но токмо одной ртути мъсто уступаеть.
- 3. Перемъжающаяся лихорадка припадочная есть та, которая имъя свое начало от собственной своей причины, приключается любострастным в людям 4.

4. Она врачуется лихорадочную коркою внутренно употребляемою купно со ртупью.

отдъление и.

О любострастныхъ судоргахъ.

I AABA HEPBAA.

О Любострастной ловсю дной су доргв.

- 1. Любострастная повсюдная судорга есть судорожное сокращение всъхъ мыщицъ хребетныхъ, челюстныхъ и членовныхъ.
- 2. Судорга повсюдная, от любострастной повсюдной заразы происходящая, познается по настоящим внакам добострастной бользни свойственным добострастной добострастног

Врачеваніе требуеть камединной ртупи купно съ соннымь зельемь; или если не льзя глотать ртупи, по причинь челюстей крыпко сожатыхь или сведенныхь; въ такомь случать должно внъ употреблять промывательныя состоящія изъ камединной ртупи и соннаго зелья: а при томь внъ тереть составы ртупью, даже до произведенія слинотеченія.

3. Судорга, от скрытной любострастной заразы происходящая, можеть распознаваться по давнимь и прежде бывшимь любоспрастнымь бользнямь. ВраВрачевание есть тожь самое, что и въ первомъ видъ.

TAABABTOPAA.

О Любострастной ладугей бользни.

- 1. Любострастная падучая бользнь есть временная цълаго тъла судорга, съ совершеннымъ потеряниемъ чувствъ.
- 2. Падучая бользнь от внутренняго костнаго наращентя головнаго черепа. Оную распознавать можно по постоянной боли, подъ самымъ толовнымъ черепомъ, въ какомъ нтесть мъстъ ощущаемой.

Въ сей болъзни можно внутренно давать камединную ртуть и взваръ волчьято корня. Такъже можно на болящемъ мъстъ учинить просверливанте, яко послъднее средство.

3. Падучая бользнь от скрытной любострастной заразы, есть немочь младольтных в дътей рожденных в от таковых в родителей, кои прежде сами страдали любострастною заразою.

Въ семъ случат можно шаковымъ младенцамъ давать сиропъ съ камединною ртупью.

отд Баенге III.

О любострастномъ безсилги или разслабленги тъла.

IAABA HEPBAR.

О Любострастной слабости.

- 1. Любострастная слабость тъла есть крайнее безсил в всъх в тълесных в частей, отв любострастной заразы происходящее.
- 2. Слабость тела от скрытной любострастной бользни. Таковая немочь чрезь шесть леть, продолжаемою млечною діетою и употребляемыми ртутьными лекарствами уврачевана была.
- 3. Слабость тъла отъ любострастной лихорадки. Зри лихорадка любострастная.

TAABA BTOPAN.

Олюбострастномъ ларамись нижнихъ удоеъ.

- 1. Любострастный параличь нижних удовь есть разслабление ного и лядвий, оть любострастной бользни происходящее.
- 2. Параличь нижних в частей от в прекращентя бълой грыжи. Врачеванте требуеть, кромъ внутренняго камединной ртути употреблентя, еще и того, чтобы прививантемь произвести бълую грыжу.

 3.

3. Параличь нижних в частей от нароста или другаго порока приключившагося около хребенной становой жилы; какЪ то случается, когда любострастной заразы мокроты засядушь вы самомы каналь позвоночномы, или вы хребешной косши.

Врачевание испышывашь можно то жъ самое, что и въ случат любострастныхъ наростовЪ.

TAABA TPETBA.

О ларамить мобострастномо половины твла.

- 1. Параличь любострастный половины твла есть разслабление правой или лавой стороны, начиная от самой головной макушки даже до самой подошвы ноги, любострастнымь ядомь причиненное.
- 2. Параличь половины тъла от прекращенія бълой грыжи. Требуеть того жь врачеванія, что и выште сего описанный параличь нижних в частей, от прекращения бълой грыжи случающійся.
- 3. Параличь половины шела, от какого ніесть порока или порчи в головном черепъ или мозгъ произходящій. Такимъ по образомь сея болъзни причиною были нарость внутренней бляшки головнаго черепа, или

частная мозга затвердълость, возгноенте или другій какій ніесть порокъ.

Врачеваніе шаковаго паралича есшь многошрудно, и рѣдко бываешь удачливо; однакожь можно оное предпринимать посредствомь ршути и взвара волчьяго корня и пасліона.

отд Бленге IV.

О Любострастной боли.

TAABA HEPBAA.

О любострастном в Главобольніп.

- 1. Любострастное главобольние есть боль вы головь, любострастнымы ядомы причиненное.
- 2. Оно по большой части въ вечернее время усиливается, ночью бываетъ прежестокое, такъ какъ будто бы кости головнаго черепа одни отъ другихъ развалиться или от дълиться хотъли; а около утра снова умаляется или послабляетъ.
- 3. Главобольніе от повсюдной, или явственной любостраспіной бользни. Въ семъ видь ломь въ составахь, ломота и боль въ костяхь и во есемь тъль совокупно случаются. Таковая головная боль найпаче лобь, или чело и затылокь объемлеть.

Враче-

Врачеваніе требуеть камединной ртути употребленія и взваровь, любострастной бользни сопротивляющихся.

4. Главобольніе от нароста головнаго черепа, познается по опухоли и боли местной или постоянной.

Врачевание есть то жЪ самое, что и въ

5. Главобольніе от потаенной заразы. Вь семь видь прочіе припадки любострастиные не оказываются; однакожь боль, ночью ожесточающаяся, наводить нькоторое о сей бользни сомньніе; и для того врачеваніе требуеть употребленія ртути.

TAABABTOPAA.

О Любострастной безсонницв.

1. Любострастная безсонница есть то, когда сна отнюдь нъть, по причинъ яда или боли, оть любострастной болъзни произходящихь.

2. Безсонница от боли. Всякой любострастной боли есть такое свойство, что оная ночью, и от постельной теплоты, умножается. Таковая боль вы вечеру наступаеть, о полуночи бываеть несносною, а около утра послабляеть и умаляется. И потому то любострастною бользнію зараженные, по причинь прежестокой боли часто встають съ постели, ложатся на холодномь полу въ своей спальнь, и только начинають засыпать при восхожденіи утренной денницы.

3. Безссоница без боли. Любострастной бользни подверженные, иногда без всякой, или по крайней мър без великой боли отнюдь спать не могуть. Я видъль, что младенцы страдающе токмо одними любострастными пятнами, может быть по причинъ любострастнаго зуда, въ самую полночь, чрез мног седмицы сряду кричали и не спали.

Врачеванте требуеть употреблентя ртути.

IAABA TPETBA.

- О Любострастном в Грудном в колотыв.
- 1. Любострастное грудное колотье есть боль, любострастным в ядом причиненная.
- 2. Грудное колошье от нароста на ребръ, или грудинной кости, познается по мъсшной опухоли и постоянной боли на оныхъ костяхъ.

Врачевание совершается такимъ же обра-

- 3. Грудное колошье от потаенной заразы. Объ ономъ подозръвать можно по ожесточентю боли бывающей ночью, и по тому, что оно уступаеть мъсто ртупи.
- 4. Грудное колошье от окрыплой затверды пости железы зобной грудной происходящее. Познается по тупой и постоянной боли, подъ грудинною костью ощущаемой. Зри тяжелая одышка.

TAABA YETBEPTAA.

О любострастномо колоть вы кишкахв.

- 1. Любострасшное колошье вы кишкахы есть боль вы чревныхы внутренностяхы ощущаемая, оты любострастной заразы происходящая.
- 2. Сія боль иногда повсюду ві чреві распространлющеюся, а по большой части постоянною и долговременною ві одномі місті бываеті.
- 3. Колотье чревное, или въ кишкахъ, отъ прекращентя бъли, или ото паховика разогнаннаго происходящее. Стя боль по большой части бываетъ воспалительнаго свойства; и для того врачеванте требуетъ кровопускантя, лъкарствъ воспалентю сопротивляющихся, взвара сарсапарели и камединной ртути.

4. Колотье въ кишкахъ отъ скрытной заразы. Когда послъ нечистаго соитя, безъ повреждентя или заразы дътородныхъ частей, колотье въ кишкахъ долговременное, ночью ожесточающееся случится; тогда можно по-дозръвать сей видъ колотья.

Врачевание пребусть камединной ртупи купно съ сыпнымь взваромъ сарсапарели.

IAABA HATAA.

О любострастной люмоть.

- 1. Любоспрастная ломота есть жестокая боль въ составахъ, ночью найпаче обезпокоивающая и усиливающаяся, отъ любострастнаго яда происходящая.
- 2. Ломоша любострастная по большой части поражаеть средину членовь, и не столь часто, какь прочте виды ломошы, мучить самые члены.
- 3. Ломота от повсюдной или явственной заразы. Она наступает вмъстъ со прочими любострастными припадками: легко разпознается: и, если не есть еще закоренълою; то легко врачуется камединною ртутью.
- 4. Ломоша от скрышной заразы. Она обыкновенно приключается послъ того, когда любострастные паховики чрезъ долгое время

время разбиваемы, и малыя язвы бывшія на самой плъшкъ, высущены были.

Врачевание есть то жъ самое что и въ

ГЛАВА ШЕСТАЯ.

О любострастной просту Дв.

т. Любострастная простуда есть боль въ одной или многихъ мышицахъ ощущае-мая, любострастнымъ ядомъ причиненная.

2. Она по большой части бываеть мъстною, и ночью ожесточается и усиливается.

3. Врачеваніе пребуеть камединной ртупи купно со взваромь изълькарственных деревь и сарсапарели составленнымь, а при томь еще и тепловатой купьли.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ.

о любострастной шіагра.

1. Любострастная штагра есть боль въ съдальных в костяхь, от влюбострастной заразы раждающаяся.

2. Штагра от паховика разогнаннаго. Я дважды видъль, что от паховика изчезнувшаго боль около членосоединентя бедровой кости съ неименованною, воспослъдовала, и больные от того хромыми содълались.

И 4

· squ

Враче-

Врачеваніе требуеть камединной ртути, сурмы и сарсапарели.

3. Штагра от скрытной заразы. Сей видь бользни распознается от прочих в ея видовъ чрезъ преждебывштя примъты и ожесточенте ночью.

Врачеванте производить должно тъмъ же образомъ, какъ и въ первомъ видъ.

IAABA OCMAR.

О любострастной костной боли.

- 1. Любострастная костная боль въ самихъ костяхъ причиняется любострастнымъ ядомъ.
- 2. Боль костная от явной или повсюдной заразы. Она бывает прежестокая, власно, как костную связь раздробляющая, так что кажется, будьто бы кости одна от другой разваливаются; большею частью объемлет лобь, затылок лопатки, плечи, лядвія и бедра а найпаче голени, так что бъдствующим болящим, опочивающим на самой мягкой постель, и покрытым легчайшими покровами, кажется будьтобы они лежат выпечь жарко истопленной, и как вогнем в жегомы бывают Ночь и постельная теплота усугубляет оную боль, а около утренняго времени она послабляет и умаляется.

Врачеваніе требуеть камединной ртути купно съ соннымь зельемь и взваромь, любоспрастной бользни сопротивляющимся.

3. Боль костная постоянная. Она имъетъ свое начало или отв нароста, или отъ размягчентя самой кости. Она распознается по существовантю сихъ бользней; а врачуется чрезъ отдаленте оныхъ. Зри наростъ костный и костетдица.

отд ѣ л Е н I Е V. О тяжеломъ дыханїи. Глава перьвая.

О любострастных в тяжелых в одышкахв.

- 1. Любострастная тяжелая одышка есть долговременное трудное дыханіе, любострастным в ядом причиненное.
- 2. Тяжелое дыханіе от скрытной заразы. Весьма рѣдко тяжелое дыханіе бываеть припадкомь повсюдной или явственной заразы; а чаще любострастная бользнь есть скрытная, или потаенная. Иногда она производить наросты на ребрахь, или сгущая сукровицу въ легкомь, причиняеть затвердълости и нарывы въ ономь.

Врачеваніе требуеть камединной ртути употребленія, купно со взварами разводящими, любострастной бользни сопротивляющимися.

- 3. Тяжелое дыханте от какого нтесть порока въ дыхалъ. Стю бользнь видали врачи произшедшую от того, что дыхало любострастнымъ ядомъ разъедено было, а уврачевали оную отняттемъ хрящеватаго кольца.
- 4. Тяжелое дыханіе от зобной железы вспухшей. Во многих трупах людей зараженных любострастною бользнію, кои во время своей жизни страдали тяжелым дыханіем, по смерти их найдена зобная железа заваленная, вспухлая и гнилью пораженная.

TAABA BTOPAN.

О любострастномъ кашлъ.

- 1. Любострастный кашель есть отдыханіе звонкое и судорожное, любострастнымь ядомь причиненное.
- 2. Кашель от прекращентя бълой грыжи. Вещество бълой грыжи около воздушной трубы, или дыхала засъдшее, причиняет сей кашель.

Врачеваніе требуеть камединной ртути и произведенія вновь бълой грыжи.

3. Кашель от явственной или повсюдной бълой грыжи. Разпознается по тому, когда когда любострастной бользни припадки существують. Врачеваніе требуеть камединной ртупи купно со взваромь сарсапарели. Разтворь водочный сулемы вы любострастныхы бользняхы, грудь заражающихы, есть весьма вредень.

TAABA TPETBA.

О Любострастной хримотв.

- 1. Хрипота любострастная есть произношение гласа неравное, трудное и неявственное, любострастным в ядом в заражающим в дыхало причиняемая.
- 2. Хрипота от язвъ въ дыхалъ находящихся: какъ то въ мертвыхъ тълахъ иногда оныя найдены. Врачеванте требуеть камединной ртути употреблентя купно со взваромъ сарсапарели.
- 3. Хрипоша от скрытной заразы. Я видъль человъка чрезь долгое время страдавшаго любострастною чесоткою, хрипотою, и кашлемь, и выпользовавшагося чрезь внутреннее употребление камединной ртуши и застуженныхь похлебокь.

140 слиношечение. позывъ на низъ.

отд Бленге VI.

О любострастныхъ истеченіяхъ мо-кротъ.

ГЛАВА ПЕРЬВАЯ.

О любострастномъ слинотегении.

- 1. Любострастное слинотечение называется то, когда слина или слизь часто изо рта вонь истекають и выплевываются.
- 2. Слинотеченте от язвъ гортани. Таковыя язвы, раздражая чувственныя жилы железь, слизь, возгри и слину от въляющихь, и безъ употреблентя ртути причиняють слинотеченте. Врачеванте требуеть того, чтобъ оныя язвы уврачеваны были. Зри жабу съ язвами сопряженную.

TAABA BTOPAN.

О любострастном в позыва ко изпражнению низомь.

- 1. Любострастный позывь къ испражненію на низь есть безпрерывное къ тому побужденіе, но токмо съ весьма малымь изверженіемь клейкой слизи.
- 2. Безпрерывный позыв къ испражненїю, от бълой грыжи происходящій. Онъ раж-

тноетечение. мочетечение тнойное. 141 раждается от воспаления предстательной железы. О врачевании зри воспаление оной железы.

I.AABA TPETBA.

О мобострастномь гноетегении.

- 1. Любострастное гноетечение есть испражнение гноеватой слизи или настоящаго гноя изъ задняго прохода.
- 2. Гноешечение от язвы задней кишки происходящее. Оно часто приключается послъ возгноения предстательной железы. Врачевание требует впрыскиванья бальсамическаго ртутьнаго раствора.
- 3. Гноешечение безъ всякихъ язвъ. Я видълъ юношу страдавшаго опухольми, задний проходъ объемлющими, у коего въ то жъ самое время и гноеватая слизь истекала изъ онаго прохода.

TAABA YETBEPTAN.

О любострастном в гиойном в могетегеніп.

- 1. Любострастное тнойное мочетечение есть испускание урины тноеватой, любострастным в домъ причиненное.
- 2. Гнойное мочетечение от язвы моче-ваго пузыря. Когда любострастная язва за-

ражаеть впадину мочеваго пузыря; въ такомь случав сіе гнойное мочешеченіе примвчается. Врачевание требуеть внутренняго камединной ршуши упошребленія купно съ соннымЪ зельемЪ и водяною вышяжкою смирны.

з. Гнойное мочетечение от бълой грыжи происходящее. Обыкновенно при окончании былой грыжи волоконцы клейкія, возгривыя или гнойныя в мочи примъчаются. Оно врачуется само собою.

отд Бленіе VII.

О оскудьнии тылесныхы силь.

ГЛАВА ПЕРБВАЯ.

О любострастномо изсушении тъла.

- 1. Любострастное изсушение твла есть оскудение соковь безь медленной лихорадки.
- 2. Изсущение тъла от бълой грыжи или оть теченія были. Оно бываеть сопряжено съ долговременною бълою трыжею у мущинъ, и съ таковымъже течениемъ бъли у женъ случающимся. Врачевание требуеть, кромъ лъченія бълой грыжи или бъли, еще кръпительных в лъкарствв и доброй питательной пищи.

3. Изсушение шъла от затвердълыхъ желъзъ.

Вскрытіе мертвых вталь, любострастною бользнію зараженных в, научаеть нась, что оныя железы часто отв любострастнаго яда премъняются вы затвердълыя окрылости, и причиняють изсушение всего тъла.

4. Изсушение всего тыла оты скрытной заразы. Я примытиль сей видь бользни у тыхы, кои будучи не совершенно оты любострастной заразы исцыленны, воздерживаются оты употребления ртути. Ибо таковые по употреблени камединной ртути и взвара сарсапарели, вы скоромы времени содылались тучными и полнотылыми.

TAABA BTOPAR.

О мобострастной сухоткь.

- 1. Любострастная сухотка есть оскуденте добрых соков и изсушенте тела съ медленною лихорадкою, однакож без кашля и без выплевывантя гноя.
- 2. Сухошка от ночной боли. Таким образом в ломотною костною болью, и безсонницею любострастною страждуще, вскоръ истощены будучи, обыкновенно поражаются медлънною лихорадкою. Врачевание

требуеть камединной ртути купно съ соннымь зельемь, взвара сарсапарели и исландскаго моха съ молокомь.

- 3. Сухошка от любострастной язвы, как то от уязвленія матки, от нарыва вы легком или вы другой внутренности. Нарывы вы легком любострастный иногда чрезы долгое время больных ихорадочным истощеніем изнуряеть, а на последок и убиваеть. Врачеваніе то жы самое предпріємлется, что и вы первомы видь, однакож рыдко бываеть удачливо.
- 4. Сухотка от язвы в костном мозтъ. Она познается по наростъ костном гніючем, или по внутренной костет дицъ.

Врачевание требуеть того, чтобь пробуравить зараженное мъсто. Зригниль внутры-костная.

5. Сухотка от затверд влости, или от в наращентя любострастных вугорков в в легком в. Сей вид в сухотки вм вств причиняет и тяжелое дыханте, и по большей части смерто окончевается. Зри тяжелое дыханте.

IAABA TPETBA.

О любострастной тахоткв.

- 1. Любострастная чахотка есть изсушеніе тьла купно съ выплевываніемъ гноя, съ кашлемъ и медльнною лихорадкою.
- 2. Чахотка грудная есть та, которая имъеть свое начало оть любострастной язвы плющей, а познается по преждебывшему тяжелому дыханію и выплевыванію клейкихь густыхь и гнойныхь мокроть, бывающему при любострастныхь бользняхь. Сей видь чахотки ръдко врачуется; а особливо если она чрезь долгое уже время продолжалася.

Врачеванте испытывать должно посредствомъ камединной ртути взваромъ сарсапарели и исланскаго моха, купно съ лихорадочною коркою, медомъ и молокомъ. Ерачь Мортонъ въ семъ случат похваляетъ минеральнаго Эетопа.

3. Чахотка гортанная есть та, которая имъетъ свое начало отъ язвъ, гортань сильно разъъдающихъ. Она разпознается по хрипливому или сипливому голосу.

Хотя въ сей чахоткъ легкое бываеть здорово: однакожъ болящій страждеть час- тымъ гноеватых в мокроть выплевываніемь, из-

сушеніем в тъла и медльнною лихорадкою. При всем же том сей видь скоряе врачуется, чым первый.

Врачеваніе требуеть сперьва льченія гор-тани. О чемь зри жабу язвенную.

отдъление VIII.

- О любострастной бользни беремын-
- т. Опышы насы научають, что жены страждущія былою грыжею, не токмо зачать во утробы, но и будучи беремыными, вы продолженіи своея беремынности, любострастною бользнію заразиться могуть.
- 2. Въ объихъ случаяхъ любострастный ядъ, посредствомъ крови сообщается самому зароду.
- 3. Беремѣнныя жены страждущія любострастною бользнію легко выкидывають, или не доносивши раждають. Выкидываніе иногда, а не всегда при себъ имѣеть знаки любострастной бользни.
- 4. Камединная ртуть, посль кровопусканія, по собственнымь примъчаніямь моимь, безопасно беремъннымь давать можно.

Ибо оная приносить врачевание какъ беремънной женъ, такъ и ея утробному плолу.

отд Б Л Е Н І Е ІХ.

О любострастной бользни младенцевь.

1. Младенцы, либо еще въ матерней утробъ будучи, ото любострастной матери, либо уже послъ родовъ, ото любострастной кормилицы заразиться могутъ.

2. Слъдственно любострастная бользны иладенцевъ есть врожденная, или послъ ро-

довъ пріобръшенная.

3. Любострастная бользнь младенцевь врожденная. Таковые младенцы раждаются сь пятнами желтыми бывающими около задняго прохода, промежности срамнопроходной, около мошенки, или около дътороднаго уда женскаго, а иногда и по всему тълу. Оныя пятна чрезь нъсколько недъль премъняются въ закожныя, жирныя и во всъ стороны распространяющіяся язвы: часто гортань и спайки губь вмъсть развъдають; от чего толось хрипливый, безпрерывный крикь, и безсонница ночью, глотаніе трудное, и самая смерть приключаются.

Ино-

Иногда паховики у отроковь, или тече- не бъли, купно съ любострастными пят- нами вскоръ послъ родовь, или спустя не много по томъ оказываются.

4. Любострастная зараза младенцевь по-Иногда младенцы от любострастной матери, безв обыкновенных в любострастных пятень, или безь всякой инной любоспрастной порчи и заразы раждаются, а по томъ чрезъ двъ или три недъли кажушся бышь весьма здоровыми; но по исшеченіи сего времени обыкновенно очныя рѣсницы вспухають, и изь себя источають изобильную бъло-желтоватую влагу; по томъ же вскоръ, если врачебная помощь подана не будеть, оказываются любострасшныя пятна дъпородныхъ частяхъ. Для сея то причины гноешечение изъ очей есть первышимъ знакомъ потаенной любострастной бользни, въ младенцахъ существующей. Зри очное. тноешеченте.

Иногда любострастный ядь потаенно сокрывающійся, по прошествіи ньсколька льты причиняеть язвы вы гортань, или струпья на головь, или зобы и опухоли на выи, или падучую немочь. Зри бользнь многообразная.

Слъдственно отсюду явствуеть, что вы первыя послъ родовы недъли не всегда бывають достовърные знаки, по коимы можно бы было утвердить то, что новорожденный младенецы есть заражены любострастною бользнію.

- 5. Любострастная зараза младенцевь посль родовь пробретенная или нажитая. Младенцы рожденные от здоровой матери, но любострастною кормилицею будучи воспитываемые, получають язвы вы гортань, устахь, губныхь спойкахь: голось у нихь бываеть хрипливый, или сипливый, глотание трудное и невозможное; а на послъдокь изсушение всего тъла оканчиваеть жизнь оныхь.
- 6. Образъ врачевать любострастную бользнь у дъщей, отъ врачей предлагается пятеричный а именно.
 - 1) Малымъ ртупьнымъ тренїемъ тъла младенческаго. Однакожъ примъчено, что дъти симъ образомъ лъчимые, вскоръ получаютъ водяную немочь и умираютъ.
 - 2) Ртупьным в треніем в любострастной матери, грудью воспитывающей младенца. Я видаль, что и от сего образа льченія младенцы, любострастною бользнію зараженные, умирали.

- 3) Ртутнымъ тренїемъ здоровой кормилицы. Сосцы здоровой кормилицы, отъ младенца любострастнаго вскорѣ заражены будучи, по томъ дѣлаются неспособными въ воздоенїю; и для того съ великимъ трудомъ, даже и за большія деньги рѣдко можно имѣть здоровую кормилицу.
- 4) Ртупьным треніем козы, в каком ніесть м ст обритой. Такое воздоеніе есть весьма безпокойно; и как коза, так и дитя вскор погибають.
 - 5) Мореною ртутью, или иннымъ ртутьнымъ составомъ, самому младенцу или кормилицъ внутренно даемымъ. Но таковые ртутьные составы производятъ во младенцахъ кровавый поносъ, или слинотеченте смертоносное.
- 7. Образъ врачевать любострастную бользнь, врача Пленка есть сей. Онъ имъетъ обыкновение любострастной матери, когда она въ силахъ находится, сосцами кормить свое дитя, внутренно давать пилюли составленныя изъ камединной ртути, и сытной взваръ сарсапарели; а младенцу въ то жъ самое время, ежедневно по утрамъ и вечерамъ совътуетъ давать по маленькой чайной ложечкъ ртутьнаго сиропа. При чемъ утверждаетъ, что онъ симъ образомъ весьма счастливо и удачливо излъчилъ многихъ дътей,

сь помощію воздоенія машери или корми-

Сейже врачь о себъ объявляеть тако: опыты меня научили, что дъти еще въ матерней утробъ, любострастною бользнію зараженные, могуть даже и въ самой маткъ изльчиться оть оной бользни посредствомь камединной ртути, беремьнною матерью внутренно употребляемой.

отд вление х.

О любострастной бользни скрытной или потаенной.

- 1. Любосшрасшный ядь или зараза иногда чрезь долгое время, пошаенно сокрываешся вы шьль, безь причиненія всякой другой бользни.
- 2. Скрышная или пошаенная любострастная бользнь не оказывается ни какимь примытнымь знакомь, однакожь иногда заражаеть другихь чрезь плотское соите.
- 3. Время опредълить не льзя, въ которое любострастный ядь, въ тъл существующій, можеть потаенно сокрываться дотоль, поколь явственно открыется въ настоящую бользнь.

152 бользнь люб. подозришельная.

4. Если подозрѣніе есть въ томь, что любострастный ядь потаенно сокрывается въ тѣлѣ младенцевъ рожденныхъ отв зараженной матери, или воспитанныхъ любострастною кормилицею; или въ тѣлѣ взрослыхъ людей, кои нѣкогда страдали любострастною болѣзнію; или если совокупленіе съ мущиною или женщиною кажущеюся быть здоровою, заражаеть другихъ; въ такомъ случаѣ немедлѣнно должно внутрь давать камединную ртуть купно со взваромъ сарсапарели и пасліона; которыя лѣкарства, по мнѣнію врачей, выводять наружу ядь любострастный.

отд Бленіе XI.

О многообразной или подозрительной любострастной бользни.

1. Многообразная или подозришельная любострастная бользнь есть та, которая вы тыль человыческомы оказывается подымногоразличными видами друхихы бользней.

2. Любострастный ядь скрытный или явственный иногда производить бользни, любострастной заразъ необыкновенныя.

- 3. Любострастныя бользни обыкновенныя суть сій: былая грыжа, язвы дытородных в частей и гортани, паховики, опухоли или шишки около задняго прохода, незалупа, костные наросты, патна желтыя на тыль, ломота и главобольніе ночное.
- 4. Любострастныя бользни необыкновенныя суть сїи: любострастная лихорадка, кашель, колотье въ животь, слабость, параличь, падучая немочь, сухотка и проч.
- 5. Нъть почти ни одной бользни, подъ которою бы не могь сокрываться ядь любострастный.
- 6. Всъ сїи бользни разпознаются по нижесльдующимъ примътамъ, аименно.
- 1) Когда мущина совершенных в льтв самв о себь сознаеть то, что онв нькогда страдаль былою грыжею, или язвами бывшими на плыткь, или паховикомь. Или 2) Когда его отець, мать, или кормилица любострастною бользно заражены были. 3) Когда настоящая бользнь сопротивляется всым обыкновенным лыкарствамь. 4) Когда бользнь около полуночи усиливается, а около утренняго времени послабляеть и умаляется. 5) Когда оть употреблентя ртути бользненные припадки уменьшаются.

1.54 бользнь люб. многосложная.

- 7. Всѣ же сїи вычисленные знаки суть токмо вѣроятные, а недостовѣрные. Ибо всякая болѣзнь страждущаго зависить единственно оть любострастнаго яда.
- 8. Врачеваніе всякой таковой подозрительной бользни требуеть употребленія камединной ртути и прочих в лькарствь, любострастной бользни сопротивляющихся.

отд Бленіе XII.

Олюбострастной бользнимногосложной, сопряженной съ какою ніесть другою.

- 1. Любострастная зараза можеть быть сопряжена со всякою другою бользнію.
- 2. Таковое сопряжение бользней иногда потемняеть и угадку и врачевание оныхв, и причиняеть вь ономь великое затруднение.
- з. Сопряжение любострастной бользни всего чаще случается.
 - 1) СЪ цынгою. Когда цынготный вмѣстѣ есть подверженЪ любострастной болѣзни: тота врачеваніе оныя есть весьма трудно; по тому, что ртуть въ больныхъ цынготныхъ дъйствуетъ на подобіе яда. И для того врачеваніе больныхъ цынготно Любострастныхъ требуєть того, чтобъ сперьва имъ внутрен-

ныя, а по томь присоединять къ онымъ мало по малу уже камединную ртуть купно съ соннымъ зъльемъ. Наливокъ солодовой купно съ сокомъ жерухи, ложжечной травы, или ибунки, предъ всъми прочими здъсь найболъе приличествують. Скорченте колънъ иногда послъ употреблентя ртути приключается тъмъ, у коихъ цынга еще не явственно открылась; врачуется же хорошо лъкарствами противущинготными, а особливо припаркою состоящею изъ травы молодыла мълко истолченной.

- 2) СЪ зобомЪ, или выйными желваками. БольнымЪ подверженнымЪ любострастной заразѣ и выйной опухоли, безопасно ршуть давать можно. Пилюли составленныя изЪ таковыхЪ лѣкарствЪ, кои сопротивляются сего города опухолямЪ, и изЪ минеральнаго еейопа, отЪ многихЪ врачей отлично похваляются противЪ зобовЪ.
- 3) Съ проказою. О семъ сопряжении бользней зри любострастная проказа.
- 4) СЪ зудомъ или коростою. Любострастныя язвы у больныхъ чесоточныхъ, по большой части от употребления ртути дълаются хужъ; для сея причины сперьва чесотку скрытиную или явную, порошкомъ состоящимъ изъ Эбгопа минеральнаго, или изъ перечищенной съры, и канфоры нъсколькихъ гранъ, и наливкомъ

ливкомъ бузиновыхъ цвътовъ, также и прочими противучесоточными лъкарствами лъчить, а по томъ уже ртуть внутренно давать надлежитъ.

5) СЬ жестокою бользнію. Когда лихорадка воспалительная желчная, или гніючая приключится любострастному; шогда онь находится вы превеликой опасности. Однакожы врачеваніе противы жестокой бользни направлять должно.

Любострастная зараза от моровой язвы не предъохраняеть, какъ то нъкоторые несправедливо думали.

б) СЪ разными бользными, отъ неумъренности въ любострасти происходящими. Таковыя бользни часто поражають любострастныхъ. Отъ неумъреннаго потерянія съмени раждаются усталость, боль въ головъ и мозгъ, падучая немочь, притупленіе всъхъ чувствъ, а особливо притупленіе зрънія, слъпота, изсушеніе шьла, чахотка, медльнная лихорадка, бълая грыжа, и истеченіе съмени особливо ночью. Сій бользни разпознаются изъ повъсти болящаго, изъ припадковъ предшествующихъ заразъ, изъ бездъйствія мошенки и изъ прочихъ знаковъ.

Врачеваніе требуеть, кромѣ камединной ртути въ маломъ количествъ употребляемой, еще и нижеслъдующаго, а именно.

- а) Воздержанія от плотскаго совокупленія и от Б испусканія съмени; b) Пищи состоящей изъ таких питательных веществь, кои легко и скоро свариваются, каковыя суть сарачинское пшено, желе или застуженныя похлебки, молоко; а особливо исландскій мохъ здась полезень; с) Питья состоящаго изъ ячменя и сарсапарели, вЪ молокѣ разваренныхЪ; d) Свъжаго и открытаго загородняго воздуха; е) Лихорадочной корки купно съ жельзными опилками, коричною шинкшурою, и горькими крыпительными лекарствами, если токмо медленная лихорадка не показываеть чего ніесть сему противнаго; f) Холодной бани или купьли, которою ослабъвшее шело весьма сильно подкрепляешся.
- 7) СЪ бользными ртутью причиненными. Дьйствіе от употребленія ртути различать должно от дьйствій, любострастным в ядом в причиненных в; дабы кто ніесть, без в разсмотрынія считая бельзни, от в ртути происходящія, любострастными, и умножая количество ртути, не погубил в болящаго.

Дъйствія же ртути въ неумъренномъ количествъ употребляемой, суть нижесльдующія:

а) Кровообращение усугубленное такъ, что число биений боевыхъ жилъ иногда простирается даже отъ 120 до 130.

- Разжиженіе крови; от чего льживое многокровіе, и воспалительная лихорадка, часто при началѣ врачеванія посредствомъ ртути, примѣчается.
- с) Гнилость крови. От чего вы продолжении врачевания, иногда лихорадка гноевато-желчная сопряженная сы кровотечениями и смерть; или цынга со слабостию кольны и кровоточащими деснами; от чего вонь изорота исходящая, моча и пот смердящия; а от того кровавое слинотечение приключаются.
- d) Слинотеченіе неумъренное. Отб того тъло истощенное, слабое, иногда во всѣхъ членосоединеніяхъ скорченное; отб того жаба или воспаленіе гортани, съ весьма худыми язвами около слинныхъ протоковъ на внутренной поверхности ланитъ и подъ языкомъ; отб того задохъ, слиноточащимъ больнымъ, и самая смерть приключаются. Иногда скорченіе челюстей и соращеніе ланитъ съ самими деснами, по преодольній слинотеченія, остаются.
- е) Осадка ртути въ различныхъ мѣстахъ, а особливо въ костяхъ. Отъ того боль въ составахъ или въ костяхъ, дрожаніе, кровоплеванье, оскудѣніе силъ, разширеніе кровоносныхъ сосудовъ, падучая немочь, и прочія долговременныя болѣзни приключаются.
- 4. Ошсюду явсшвуеть, что бользни ртушью причиненныя могуть раздълены быть

отдѣ-

на воспалишельныя, тніючія и долговременныя.

- ,5. Болъзни воспалишельныя, равно какъ лихорадка и жаба воспалительная, требують: 1) Воздержанія оть употребленія ртутыных лъкарствь; 2) кровопусканія; 3) слабишельных в легких в воспалентю сопрошивляющихся; 4) емульсїй или оршада съ селитрою; и 5) Взвара ячменнаго купно съ селитрою и аравійскою камедью.
- 6. Бользни гиїючія, какъ то лихорадка гніючая, язвы усшныя смердящія и цынга, кромъ ртупьных в лъкарствв, требують 1) наливка солодовато ячменнаго съ соками противуцынготными; 2) корки лихорадочной, и 3) пищи изъ растъній состоящей.
- 7. Болъзни долговременныя отв ртути, въ тъль оставшей, произшедшія, какъ то: скорчение или сведение связокь, боль въ составах в и дрожание мышицв, врачуются, если къ лъкарствамъ прошивуцынгошнымъ присоединенны будуть, еще и нижесльдующія: 1) бани парныя, или теплая купъль многокрашно повторяемыя. 2) потовыя, как то взварь корня девесиловаго, или царского, есенція пимпинели, а особливо аншимонія или сурьма. 3) иногда просныя; и 4) молоко; а для истощенных д йета молочная пользують.

160 предъохранение опть люб. болъзни...

отдъление. хии.

- О предъохранении от любострастной бользни.
- 1. Средство, которое могло бы воспрепятствовать тому, дабы здоровый мущина, совокупляясь съ женщиною имъющею бъль, или язвы въ рукавъ матки, не заражался любострастныхъ ядомъ, или заразившись онымъ, снова отъ онаго моглъ бы освободиться, еще и понынъ неизвъстно.
- 2. Омовенте дътороднаго уда, вскоръ послъ совокуплентя чинимое, иногда полезно быть можеть, если зараза любострастная еще не проникла въ самыя ложжинки мочеиспускательнаго ствола. Но по большей части оный ядь скоро всасывается въ скважинки оныхъ ложжинокъ.
- 3. Смазыванте дътороднаго уда, чинимое прежде совокуплентя, посредствомъ масла или ртупьной мази, или мътечекъ наложенный на дътородный удъ, и вымышленный сообразно рукаву матки, кондономъ именуемый, и прочте презрительные искусственные способы, отнюдъ не отвращаютъ заразы; какъ то я на многихъ больныхъ испыталъ многократно.

предъохранение от люб. бользни. 161

4. Впрыскиваніе мыльнаго щолока, или цыпроннаго сока, водою разведеннаго, и неиедлінно послі совокупленія употребляемаго, и прочія отб разных писателей похваляемыя средства не иміли добраго успіха, какъ то опыты нась научають.

5. Больших в успъхов в ожидать должно от раствора мореной или сладкой, или ка-мединной ртути, молоком в раствореннаго, и употребляемаго вмъсто полосканья, и впрыскиванья. Хотя все сте многими опытами, нарочитои съ намърентем в учиненными; еще болъе впредь изслъдовать остается.

6. Слъдственно воздержанте от любострастнаго блага, есть единое и надежнъйшее предбохранительное средство от любострастнаго зла.

Конець второй части.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ.

отд Бленге І.

- 1. Врачебныя предписанія лекарствь, въ семь сочиненій похваляемыхь.
 - I) Внутреннія врасебныя предлисанія.
 - 1. РастворЪ камединной ртути.

Возми живой перечищенной ртупи драхму 1. Аравійской камеди въ порошокъ разтертой драхмъ 3.

Сиропа цихорейнаго и ревеннаго сколько потребно. Мѣшай долго въ стеклянной ступкѣ, мало по малу прибавляя нѣсколько сиропа, поколѣ вся ртуть совершенно превратится въ клей чли клей-кую слизь. Когда весь составъ хорошо смѣшаешся, тогда мало помалу прибавляй розовой воды унцовъ 12. По томъ храни его въ стеклянной банкѣ, и по утру и въ вечеру употребляй по столовой деревянной ложкѣ.

Употребленіе. Сей растворь есть первыйшимы лыкарственнымы внутреннимы средствомы во всыхы любострастиныхы бользняхы; ибо онымы скоро, безопасно и пріятно истребляется любострастиная зараза. Оны рыдко причиняеты слинотечение, особливо если пилюли проносныя, или порошокы проносный же, внутренно даны будуты чрезы каждые десять дней. Растворы принимать должно вы деревянной ложкы по тому, что ртуть легко пристаеты кы серебреной, или изы другаго крушца заыланной ложкы. Ты, у коихы слина начинаеты течь, должны принять проносное лыкартинаеты течь, должны принять проносное лыкарты техностинаеты технос

I. Formulae remediorum in boc opusculo laudatorum.

- I) Formulae internae.
- 1. Solutio mercurii gummosi.
- R. Mercurii vivi deputatissimi 3i. gummi arabici puluerisati. 3iij. Syrupi cichorei cum rheo. q. s.
- Conterantur in mortario vitreo, sensim adfundento aliquantum syrupi, donec mercurius omnis abiit in mucum. His satis subactis, addantur sensim conterendo.

Aquae rofarum 3xij.

Detur in ampullam. S. mane ac vesperi duo cochlearia lignea mensualia assumantur.

Usus. Haec solutio in omnibus morbis venereis primarium remedium internum est, quod cito, tuto ac
jucunde miasma venereum delet. Raro saliuam movet,
si omni decima die pilulae purgantes vel pulvis
purgans exhibeatur. Solutio ex cochleari ligneo
assumi debet; cochleari enim argenteo vel metallico mercurius adhaeret, Quibus saliva moveri incipit,

164 внутреннія врачебныя предписанія.

ство, и чрезъ нъсколько дней воздержаться отъ употребления сего раствора.

2. Пилюли состоящія изд камединной ртути.

Возми живой ртути перечищенной драхму 1. Аравійской в порошок разтершой камеди драхмы 3. сиропа цихорейнаго и ревеннаго, сколько потребно. Мъшай все хорошо в мраморной или стеклянной ступк, пока вся ртуть превратится в клейкую слизь. По том к ней прибавы мягкаго пшеничнаго клаба поль унца. Хорошо смышав все, здалай из того пилюли в сом в 3 грана, и посыпав оныя порошком солодковаго корня, употребляй по утрам и по вечерам по 10 пилюль.

Употребленіе. Сій пилюли лучше внутренно принимать можно, чёмь растворь; и по тому я чрезь нёсколько лёть сряду весьма часто сь великою пользою оныя больнымь предписываю. Уже чрезь два года кы нимь примёшиваю полдрахмы перечищеннаго соннаго зёлья, и называю оныя пилюлями ртутьными и опіатными

или усышишельными.

3. Сиролъ ртутьный.

Возми живой перечищенной ртупи гран 20. Аравійской в порошок растертой камеди гран 60. Сиропа ревеннаго и цихорейнаго сколько потребно, мышай все в стеклянной ступк, поколь ртупь превратится в клейкую слизь; сверх того при растираніи прибавь еще сиропа цихорейнаго и ревеннаго унц 1. с половиною. Смышай все, и давай по утру и в вечеру дытят по маленькой деревянной ложечк; количество же онаго мало по малу умножать должно.

hi assumant pargans, et aliquot dies a solutione ab-

2. Pilulae ex mercurio gummoso.

Ry. Mercurii vivi depuratissimi 3i. gummi arabici puluerisati 3ii. Syrupi cichorei cum rheo. q. s.

Conterantur bene in mortario marmoreo vel vitreo, donec mercurius omnis in mucum abiit; tunc adde micae panis albissimi 3\beta.

Vsus. Commodior harum pilularum, quam salutionis assumptio est; hinc ab aliquod jam annis frequentissime his pilulis magno cum essectu utor. jam a duobus annis 3\beta Opii depurati admisseo, et pilulas a mercurio guinmoso-opiato voco.

3. Syrupus mercurialis.

Ry. Mercurii vivi depuratissimi. 3i. gummi arabici puluerisati 3ii. Syrupi cichorei c. rheo. q. s.

m. Conterantur in mortario vitreo, donec mercurius abiit in mucum; adde insuper conterendo.

Syrupi cichorei c. rheo 3i 3.

m. d. u. S. mane ac vesperi detur infantibus cochleare paruum ligneum; dosis sensim augeatur.

K 3

Упот-

166 внутренія врачебныя предписанія.

Употребленіе. Сей сиропъ весьма способно давать можно младенцамъ, любострастною бользнію зараженнымъ.

4. Обыкновенныя проносныя лимоми.

Возми состава пилюль Руффовых полдрахмы, смолы ялапповой и мореной ртути по 4 грана, смъщай все, здълай пилюли въсомы въ 3 грана и прими на одинъ пртемъ.

Употребление. Я сими пилюлями произвожу слабительное дъйствие у тъхъ, кои ртуть употребляють. Онъ легко и дъйствительно слабять по 7 разъ и больте. Болье чъмъ тысячи
больнымъ оныя мною предписаны были, и не
причинили онымъ сильнаго проноснаго дъйствия
ни рвоты.

5. Взваръ проскурняка большаго.

Возми корня большаго проскурняка унцовъ 2, листорсти. Вари въ довольномъ количествъ воды чрезъ четверть часа; процъженнаго взвара фунтовъ 2 употребляй чрезъ 2 часа по 2 чашки или стакана, усладивъ сахаромъ или сиропомъ усыпительнымъ.

Употребление. Онъ пользуеть во время воспалительное бълой грыжи и въдругихъ бользняхъ.

6. Порошокъ легкославительный отъ вълой грыжи.

Возми отборнато ревеню, соли удивительной и перечищеннаго виннаго камня по 3 драхмы, смѣшавъ изотри въ порошокъ, раздѣли его на 12 равныхъ частей, и ежедневно чрезъ 3 часа употребляй по одному порошку.

Usus.

Usus. infantibus venereis hicce syrupus commodissime adhibetur.

4. Pilulae purgantes ordinariae.

Ry. Massae pilularum Russi 3β. resinae ialappae. aquilae albae āā gr. 1v.

m. f. pil. gr. iij. S. assumantur pro una dosi.

Usus. His pilulis omni decimo die alvum moveo illis, qui mercurio utuntur. Hae pilulae septies vel saepius alvum facile et certo movent, millenis aegrotis praescriptae hypercatharsin non causarunt.

5. Decoctum althece.

R. Radicis altheæ 31.

Fol. malvae.

Flor. papav. rhoeatos aa m\beta.

Coque in. S. q. aquae per horae quadrantem. Dentur col. Hy.

S. Omni bihorio cum fyrupo diacodii vel facharo hauriantur vafcula duo.

Usus. in Gonorhoeae et aliorum morborum stadio inflammatorio conducit.

6. Pulvis eccoproticus ad gonorrhaeam.

Ry. Rhei electi.

Salis mirabilis.

cremoris tartari ãã 3iij.

m. f. pulv. dividatur in xii doses aequales. S. omni trihorio de die assumatur unus.

168 внутреннія врачебныя придписанія.

Употребленіе. Он умвриваеть жарь моченспускательнаго ствола, и чрезь несколько недель переменяеть белогрыжной гной вы водяную влагу.

7. Бальсамитеская кашка отд былой грыжи.

Возми отборнаго ревеню, удивительной соли и перечищеннаго виннаго камня по 3 драхмы, бальсама копайскаго съ сахаромъ хорошо растертаго полдрахмы; кашки слабительной сколько потребно; смъщай все, сдълай кашку и ежедневно употребляй по полудрахмъ.

Употребленіе. По утоленій жара, при испусканій мочи чувствуемаго, и при истеченій водяной мокроты онб вскорв льчить бользнь, если нечрезмърное бываеть разслабленіе мочеиспу-

скательнаго ствола,

8. Кашка крълительная от бълой грыжи.

Возми корки винтеровой и перуанской по 3 драхмы, корки померанцовой и корицы, такъ же вытяжки жельзной яблочной по 2 драхмы, сиропа корки померанцовой, сколько потребно. Смьшай все, здълай кашку и употребляй ежедневно четыре раза по 1 драхмъ.

Употребленіе. Пользуеть вы случать теченія были, и во время сукровичной былой грыжи, особливо когда бользны начинаеть быть долговремянною, и болящаго приводить вы истощеніе и оску-

двиїс силь.

9. Вино кралительное.

Возми опилокъ жельзныхъ незаржавьлыхъ, корки перуанской, винтеровой и корицы по полу унцу, смъшавъ изотри въ порошокъ, налей на оной стараго австрійскаго или францускаго краснаго Usus.

Usus. compescit ardorem urethrae et pus gonorrhoicum intra aliquod septimanas reddit lymphaticum.

7. Electuarium Balsamicum ad gonorhaeam.

R. Rhei electi.

Salis mirabilis.

Cremoris tartari ãã 3iý.

Balsami copaivae cum saccharo bene subacti 3\beta.

Electuarii lenitivi q. s.

m. f. elect. S. quater de die assumatur drachma semis. Usus. Cessante urinae ardore ac essluvio iam lymphatico existente, morbum brevi curat, si non nimis magna adest laxitas urethrae.

8. Electuarium Roborans ad gonorrhaeam.

R. Cort. Winterani.

-- peruviani ãã 3iÿ.

-- aurant.

-- cinamomi.

Extract. martis pomati aa 3if.

Syrup cort. aurantiorum. q. S.

m. f. electuar. S. quater de die assumatur drachma una.

Usus. in leucorrhaea et in lymphatico gonorrhaeae stadio, si morbus incipiat chronicus sieri ac aegrotum emaciet, conducit.

o. Vinum Roborans.

Ry. Limaturae martis non rubiginos.

Cort. peruviani.

-- Cinamomi.

-- Winterani ãã 3β.

170 внутреннія врачебныя предписанія.

вина фунтовъ 2. поставь въ теплоиъ мъстъ чрезъ 24 часа, по томъ когда устоится, процъди и употребляй по 3 раза въ день по ложкъ, мало по малу умножая количество онаго.

Употребление есть то жЪ, что и кашки крѣпительной, то есть: оно лѣчитъ бѣлую грыжу и бѣль тогда, когда оныя содѣлаются не любострастными.

10. Взварб дерева бакаута.

Возми дерева бакаута наскобленнаго Ω унца, свари въ фунтахъ Ω^{1}_{2} чистой ръчной или ключевой воды, поколъ останется только фунта Ω . пей ежедневно по Ω фунта.

Употребление. Онъ найденъ прежде употребления ртути въ любострастной бользни, и у предшественниковъ нашихъ былъ единымъ въ сей немочи средствомъ. Пользуетъ найпаче людямъ мокротнымъ. Нъкоторые къ сему взвару еще придаютъ живой ртути и сурмы по 1 драхъть, завязавъ оныя въ особыя мъщечки, и называютъ взваромъ бакаутовымъ сложеннымъ.

11. Взварь деревь сурьмосый.

Возми корня сарсапарелли, сандала бѣлаго и краснаго по 3 драхмы; корня солодковаго; корки волчьяго перца по полъ унца; дерева родосскаго, бакаута и сассафраса по 1. унцу; сурмы унцовъ 2. смѣтавъ, налей кипячей чистой воды фунтовъ 10; оставь въ тепломъ мѣстѣ чрезъ 24 часа, по томъ вари на легкомъ огнѣ, поколѣ останется только фунтовъ 5, процѣди и давай больному пить сперьва по полтора фунта, а по томъ умножай количество онаго даже до 5 фунтовъ.

m. f.

m. f. pulv. cui affunde vini generosi austiaci ff . Relinque in leni digestione per 24 horas, dein colaturam per inclinationem exhibe.

S. Detur ter de die cochleare unum, sensim augendo dosin.

Usus est ut electuarii roborantis, nempe gonorrhaeam ac fluorem album, non amplius venereum, curat.

10. Decoctum ligni guaiaci.

Ry. Rasurae ligni guaiaci 3 ij. coq. in aquae sont. # ij. ad remanent. # ij.

d. S. hauriantur quotidie Hy.

Usus. Ante mercurii usum in lue venerea inuentum, unicum in hoc morbo maioribus nostris suit remedium. Convenit subiectis phlegmaticis. Sunt qui addunt decocto huic argenti vivi et antimonii crudi in sacculis singulis ligati 3i, et vocant decoctum ligni guaiaci compositum.

11. Decoctum lignorum Antimoniale.

R. Rad. Sarsaparillae
Santali albi et rubri aa ziij.
Rad. glycyrrh.
Cort. mezeraei aa z z.
Ligni rhodii.
— guaiaci

—— fassafras ãã 3i.

172 внушреннія врачебныя предписанія.

Употребление. Сей взварь есть общий Лиссабонскимь врачамь, кои онымь отвращають бользни остающияся посль слинотечения и посль употребления ртути вы большемы количествы. Зри сл. Муппая зборы лькарствы кн. 1 страниц. 338.

12. Взваръ сарсаларели.

Возми корня сарсапарели унцовь 3. Вари въ чистой ръчной или ключевой водъ фунтахъ 2 съ половиною, поколъ останется фунта 2. пей ежедневно по 2 фунта.

Употребление. Сей взваръ есть весьма хорошее разводящее и кръпительное въ любострастной бользни лъкарство. Онъ найпаче пользуетъ людямъ горячаго и многокровнаго сложения.

13. Взваръ сарсалареми сложенный.

Возми корня сарсапарели унцовь 2, корки волчьяго корня полдрахмы, вари въ чистой ключевой или ръчной водъ фунтахъ 3, поколъ останется унцовъ 30. прибавь туда водянаго раствора сулемы унцъ 1. Смъщай и употребляй ежедневно но 2. фунта, продолжая чрезъ цълой мъсяцъ.

Употребленіе. Сей взварЪ похваляется и часто употребляется вЪ закоренѣлой любострастной болѣзни закожной и вЪ костяхЪ гнѣздящейся. Зри собраніе сочиненій кЪ практическому употребленію врачей служащее.

14. Взваръ корки волгьяго корня.

Возми свъжей корки волчьяго корня поль унца, вари въ чистой водъ фунтахъ 6; поколь останется фунтовъ 4. при окончании прибавы корня солодковаго унцъ 1. Процъди и давай больному четыре раза въ сутки сего взвара по полуфунту.

m. et infund. eum aqua font. ebull. ffx. per horas 24.

Dein coqu. ad rem. ffv. Collaturae capiat aeger fft \(\beta \).

Sensim augendo dosim ad ffv.

Usus. Hoc decoctum Lisbonae inter medicos familiare est, quo morbos post ptyalismum et usum mercurii liberaliorem residuos tollunt. vid. III. Muppai. apparatum medicament. vol 1. p. 338.

12. Decoctum Sarjaparillae.

R. Radicis sarsaparillae 3iÿ. Coq. in aquae font. Hiÿß. ad remanentiam Hÿ.

d. s. Hauriantur quotidie librae duae.

Usus. Optimum diluens et mundificans in lue venerez est. Convenit praecipue subiectis calidis, sanguineis.

13. Decoctum sarsaparillae compositum.

R. Radic. Sarsaparillae 34.

Coq. in aquae fontanae Hij. ad remanentiam unc. xxx. adde solutionis aquosae sublimati 3i.

m. d. s. Hauriantur quotidie per 30 dies Hy.

Usus. in lue inveterata cutis ac ossium magni usus esse laudatur. V. Samml. zum gegrauch. practischer aerzte 2. st. 85. S.

14. Decoctum corticis mezeraei.

R. Corticis e radice mezeraei recentis 3\beta.

Coquatur in aquae fontaneae \(\frac{1}{2} \) i.

ad remanentiam \(\frac{1}{2} \) iv.

Sub finem adde radicis liquiritiae \(\frac{1}{2} \) i.

Collatura detur. S. Huius decocti \(\frac{1}{2} \) bibat aeger gyater de die,

Упош-

174 внутреннія врачебныя лькарства.

Употребленіе. Сей взварь похваляется вы случав костныхы опухолей любострастныхы, такы же оты боли вы костяхы ночью случающейся, и оты опухоли любострастной вы членосоединеніяхы бывающей.

15. Взваръ пасліона или песьяго грозда.

Возми свѣжихъ верхушекъ пасліона полдрахмы, воды рѣчной или ключевой унцовъ 16. вари поколѣ останешся унцовъ 11. пей по трижды въ день съ молокомъ по три унца или по чайной чашкъ.

Употребленіе. Сей взварЪ весьма похваляется въ костномъ наращеніи, отъ лишаевъ и ломоты любострастныхъ. Зри врачебный журналъ томъ 22 стран. 236.

II) Внъшнія врачебныя предписанія.

1. Растворъ ртутьный простый.

Возми сладкой ртути драхму 1. Клею аравійской камеди унцъ 1. Воды розовой фунтъ 1. Смъшай долго растирая въ мраморной иготъ или стеклянной ступкъ.

Употребленіе. Сей растворь служить для впрыскиванья, вь случав былой грыжи и теченія были. Я предписываль болящимь, окобольніемь оть былой грыжи произходящимь, чтобь они симь растворомь промывали очи. Оный будучи смытань сь 1. унцомь меда вны прикладывается кы язвать вмысто воды оть рань, и для полосканья гортани, вы случаь язвы тамо находящихся. Паховики, костныя опухоли, незалупа и прочія любострастныя наращенія должны быть сь верху покрываемы симь растворомь вмысто тепловатой примочки.

Ufus.

Usus. Laudatur in tophis, nodis venereis, doloribus osteocopis nocturnis, ac tumoribus venereis articulationum.

15. Decoctum stipitum dulcamarae.

Ry. Stipitum dulcamarae recent. 3B. Aquae fontanae 3xvj.

Coquantur ad uncias xj. s. ter de die bibantur cum lacte 3ii.

Usus. in exostosi, herpete, arthritide venerea valde laudatur. V. journal de medecine. F. 22. p. 236.

II) Formulae externae.

1. Solutio mercurialis simplex.

R. Mercurii dulcis 3t. mucilaginis gummi arabici 3t. Aguae rofarum #t.

m. Soluantur contetendo exacte in mortario vitreo vel marmoreo.

Usus. inseruit haec solutio pro iniectione in Gonorrhaea et sluore albo, jn ipsa ophthalmia gonorrhoica hac solutione oculos elui curabam cum mellis 3i. mixta. Ulceribus loco aquae vulnerariae ac faucibus ulcerosis forma gargarismatis applicatur. Bubones, tophi, phimosis, ac alii tumores venerei, forma fomenti, hac solutione tegantur.

176 внутреннія врачебныя предписанія.

2. Растворъ ртупьный бальсамисескій.

Возми тинктуры смирновой, или роснаго ладона поль унца; жидкаго усыпительнаго состава, взвара перуанской корки по 1. унцу; сладкой ртути грань 20. смъщай все хорошо въ ступ-

къ растирая безпрерывно и долго.

Употребление. Сей растворь врачуеть язвы гнюсныя, застарьлыя, вы рака претворяющияся, кости разывдающия, любострастныя. Когда гортань таковыми язвами поражена бываеть, вы таковомы случаь оную посредствомы кисточки дважды или трижды вы день симы растворомы смазывать должно.

3. Вода Едкая для проходных в опухолей.

Возми спирта французскаго или самой кръпкой водки; и перегнаннаго уксусу по полтора унца, сулемы драхму 1, квасцовъ, канфоры, и бълилъ по полъдрахмы, жидкаго усыпительнаго Сидентамова состава унцъ 1. смъщай все какъ должно.

Употребленіе. Проходныя опухоли, посредствомь кисточки, сею водою дважды въ день смазывать, а по томъ еще сверху ртупьною мазью прикрывать должно. Такимъ образомъ оныя опухоли вскоръ и мало помалу исчезають. Въ прочемъ кожа здоровая между таковыми опухолями обрѣтающаяся, отъ сея воды не портится и не уязвляется.

4. Молоко ртупъное.

Возми ртути перечищеной драхму 1. Аравійской камеди въ порошокъ растертой поль унца; сиропа усыпительнаго сколько потребно. Смѣшай все хорошо растирая въ мраморной иготъ, ма-

2. Solutio mercurialis Balfamica.

R. Tincturae myrrhae 3\beta.

Laud. liquid Sydenh.

decocti cort. Peruviani \(\tilde{a}\tilde{a}\tilde{3}\tilde{1}\).

aquilae albae 3\tilde{y}\).

misce conterendo.

Usus. Sordida inveterata, concrescentia et cariosa ulcera venerea sanat; si fauces talibus afficiantur ulceribus, tunc hae ope penicilli bis vel ter de die hac solutione tangantur.

3. Aqua caustica pro condilomatibus.

R. Spiritus vini rectificati.

Aceti destilati ~ 3i 3.

mercurii subl. corros. 3i.

aluminis crudi

camphorae

cerussae ~ 3\beta.

Laudani liquidi Sydenh. 3i.

m. Solut. d. u.

Usus. Condylomata ope penicilli hac aqua bis de die illiniantur, et dein linimento mercuriali tegantur. Condylomata sic brevi ac sensim evanescunt; cutis sana, condylomatibus intermedia, ab hac aqua non exulceratur.

4. Lac mercuriale.

Ry. Mercurii vivi depuratissimi 3i. gummi arabici puluerisat. 3 . Syrupi diacodii q. S. Yacma III.

ло по малу прибавляя онаго сиропа, поколь все прописанное здълается клеемъ, къ которому по томъ мало по малу прибавляй молока коровьяго парнаго или кипячаго унцовъ 8. смъ-шай все и употребляй.

Употребленіе. Сіе молоко внѣ прикладывается къ очамъ, въ случаѣ окоболѣнія бѣлою грыжею причиненнаго, посредствомъ особливаго баннаго сосудца, такъже въ незалупѣ любострастной, для полосканья дѣтороднаго уда; сверхъ того сіе жъ молоко съ великою пользою употребляется отъ жабы любострастной, съ болью сопряженной, въ видѣ полосканья.

5. Бальсамь ртутьный.

Возми мази царской полтора унца; ртути осаженной красной драхмы 2. смъщай все сколь возможно.

Употребленіе. Сей бальсам внё прикладывает ся к в любострастным взвам для заживленія, и к в костным опухолям или окрыплым затверд влостям влюбострастным Сь такоюжь пользою Г. Пленк употреблял его вмёсто ртути осаженной красной, сладкую ртуть смёшав сь каким ніесть бальсамом в.

. 6. Бальсамь отный красный.

Возми свѣжаго рускаго масла унцовъ 3. бѣлаго воску полъ унца: растонивъ все прибавь туда ртути истертой драхму 1, канфоры въ яичномъ маслѣ растворенной грапъ 45. Смѣшай и здѣлай мазь, которою количествомъ съ горошинку ежедневно по три раза смазывай болящее око.

Употребленіе. Сей бальсамЪ хорошо врачуетЬ пятна роговой очной оболочки, язвы и помраченія, такЪ же гноетеченія и прочія любострастныя очныя долговремянныя бользни.

m. Conterantur in mortario marmoreo sensim addendo syrupum donec omnia abeant in mucum, cui sensim adde.

Lactis ebullientis vaccini 3viij.

m. d. usui.

Usus, in ophthalmica gonorrhoica ope vasculi balneatorii et in phymosi venerea, forma peniluvii applicetur, jdem lac in angina venerea dolorosa sub forma gargarismatis optimo cum successu adhibetur.

5. Balfamus mercurialis.

R. Vunguent. bafilic. 3is. mercur præcipitat. rubr. 3is.

m. exactissime.

Usus. ad ulcera venerea consolidanda, ad tophos aut scirrhos venereos resolvendos, adhibetur. Eodem cum essectu, loco mercurij præcipitati rubri, mercurium dulcem, cum balsamo quodam mixtum adhibuit Plenkius.

6. Balsamus ophthalmicus ruber.

R. Butyri recentis insulsi Zių.

Cerae albae 3iÿ. liquefactis adde mercurii praecipitati rubri 3ÿβ.

Tutiae praeparatae 3i.

Camphorae in oleo ovorum 3 B. Solutae gr. XLV.

m. f. unguent. S. ter de die lentis magnitudo illiniatur oculo.

Usus. Corneae maculas, ulcera et obscurationes, nec non lippitudinem ac reliquos oculorum morbos venereos, chronicos, egregie curat.

180 внъшнія врачебныя предписанія.

7. Мазь разбивающая отб лаховиковб.

Возми мази глисто-гонной и неаполитанской по 1. унцу, корня мандрагоры въ порошокъ растертаго 1½ унца, меду сколько потребно. Смѣшай все, чтобъ была мазь.

Употребление. Сия мазь похваляется для разогнания затвердълыхъ паховиковъ. Паховикъ ноутру и въ вечеру смазывать, и по томъ сею же мазью прикрывать должно.

6. Vnguentum resoluens ad Bubones.

Ry. Vnguenti de arthanita

—— neapolitani ~~ 3j.

Pulu. rad. mandragorae 3i/3.

mellis communis. q. S.

m. f. Lenimentum.

Usus. Ad bubones induratos resoluendos laudatur. Inungatur bubo mane ac vesperi, et dein tegatur hocce unguento.

отдъленте. п.

Врасевныя приметанія на обе предвиду-

Примъч. 1. страниц. 1. №. 2. Многїе писатели, какъ то Бекеть, Саншесь и прочте утверждають, что любострастная зараза, въ Италіи и Франціи, существовала уже самымь дъломь, гораздо прежде возвращентя Хрисшофора Колумба изъ Америки. Видманъ тоже самое мыслить о Германіи. Но писашели XIV и XV въковь писали шокмо о бользняхь и язвахЪ дътороднаго уда мужескаго, кои приключилися людямь ощь плошскаго совокупленія св женщиною подверженною проказъ, или другому заразишельному и прилипчивому недугу; ибо оныя бользни были шокмо мъсшныя или часшныя, никогда не перемънялися вы любострастныя, и безь употребленія ртуши совершенно врачевалися. А настоящая любострастная бользнь свиръпствовала сперьва съ такою жестокостію, что ошнюдь не могла бы ушаишься ошь знанія столь многих врачей, кои писали о разныхь бользияхь до возвращения Колумбова, или по меньшей мъръ не была бы забыта и безименна не осталась, если бы еще прежде тахъ времень господствовала въ Европъ. Зри врача Аструка книгу о любострасшных бользняхь. Томь II.

- 2. N. 3. Нъкоторые писатели называють любострастную бользнь суфилидою, производя сте наименованте от Суфила пастуха, который пася стадо Царя Алцифоа, и горделиво величаяся какь множествомь такь и красотою овець и прочихь
 ввъренныхь его стражи животныхь, насмъказанте таковой горделивой его продерзости,
 какь сказують, низпослали стю жестокую
 бользнь на землю. Зри Фонь Свитена толкованти томь V. стр. 372. издан. Лейден.
- 3. N. 4. Сл. Галлеръ былъ шакого мивнія, что Американская бользнь именуемая лес весть мать нашей любострастной бользни. Поелику бользнь явсь, чрезь соитіе и воздоеніе дітей другимь сообщается и врачуется ртупью; по по сему думаю, товоришь сей писашель, не безь причины можно производишь начало нашей заразы отБ шой же самой бользни; хошя нъкошорые писашели вопреки сему думають, якобы бользнь явсь не есть любострастная, по тому что въ нашихъ странахъ не приключается. Любострастная же зараза съ самаго начала произвела наросты и опухоли по всему тълу; и я видъль, продолжаеть тоть же писашель, кресшянина, который почти на всъхъ пълесныхъ частяхъ, даже и между ножныхъ перстовъ и по всему лицу имъль опухоли, подобныя наращеніямь, бо-15-1 4

лъзнію явев причиняемымь. Предположивь сіе слъдуещь заключинь, что какь съмена одного и тогожь растънія, по различію теплошы, воздуха, земли и земленашесшва, производять часто различные листы, цвыты и плоды: шакъ равно и зараза явсъ могла произвести въ нашемъ климатъ другія бользни, чрезв повторение плотскаго соития и упошребление лъкарствъ, между собою различествующія. Зри Вивліотеки его врачебной Томь I. стран. 434. Врачь Шиллингь производишь начало бользни явсь ошь ядьнія плода одного растынія, музою именуемаго, который обыкновенно въ тъхъ странахъ вмъсто хлъба употребляется. Зри его книгу о болъзни почти неизвъстной въ Европъ, от Американцовъ называемой явсъ стран. 9. §. 73.

4. Сшран. 2. N. 6. Нъкоторые писатели производять начало любострастной бользни оть сообщентя со блудницами, оть соиття сь прокаженными, оть вліянтя небесных свышль и планеть, такь же оть порчи и гнилости воздуха, причиняемой частыми дождями. Инные производять оную оть повреждентя печени, оть заразительных водь, оть питья винограднаго вина, которое Гишпанцы осквернили кровтю прокаженных Инные наконець производять оную оть ядытя человыческой плоти, оть сообщентя людей сь кобылицами, оть угрызентя или ядытя нъкото-

которой Американской ядовитой ехидны. Зри Грунеровы древности бользней стран. 80. 81 Напосльдокь инные думають, что любострастная зараза оть самого Бога низпослана вы наказаніе блудниковы. Но тако мыслящіе должны бы взять вы разсужденіе и то, что весьма часто неповинные младенцы, жены, матери и кормилицы, сеюжы прилипчивою заразою безы всякой ихы собственной вины, бы выдственно страждуть.

5. Стран. 3. §. 5. Нѣкоторые писатели находятся въ такомъ мнѣнїи, что любострастная зараза есть кислаго свойства; по тому что она размягчаеть кости, фїолетовые соки дѣлаеть красными, и при томъ врачуется щелочными сольми и ртутью, о коей думають, что она въ себя всасываеть кислоту. Зри Цезана сочиненте о любострастныхъ болѣзняхъ издан. Париж. 1774. стр. 205. Однакожъ еще не совершенно доказано, что бы любострастная зараза была врачуета Алкалическими лѣкарствами; такъ же и то, какимъ бы образомъ сулема, весьма изобилующая сольною кислотою, могла въ себя всасывать любострастную кислоту.

6. — N 8) Любострастная зараза безвременная или внезапно случившаяся, о коей повъствують, яко бы оная сама собою безь нечистаго совокупленія раждается, какь то нъкоторые писатели примъчають; не есть настоящая таковая зараза, но по мнънію

нію Г. Пленка самородная порча клейкой слизи, въ мочеиспускашельномъ стволъ отдъляющейся; или скрышная любострастная бользнь, чрезъ плошское соиште или друтимъ какимъ нјесть образомъ причиненная и обнаруженная.

- 7. §. 2) Сюда шакъ же принадлежишь зараза, ошь бабокь или другихь, кои у родильниць иногда млеко устами высасывають, имь же сообщенная. Бланкардь, Блохсь и прочіе врачи своими опышами сїє самое подтверждають.
- 8. Стран. 12 N. 8) Сте правило, чтобъ долго употреблять ртуть, въ лъчени любострастной бользни, есть весьма важно. Г. Пленкъ говоритъ, что онъ видалъ таковыя шишки около задняго прохода и язвы въ горшанъ, кои хошя сперьва и умалялися отъ внутренняго ртупи употребленія: однакожЪ чрезв долгое время пребывали вв одномв состояній; и болящій, который безь труда легко и чрезъ долгое время внушренно принималь ршушь, от того напоследокь мучился различными бользненными припадками, какъ то усталостью, небольшою лихорадкою, потеряниемь позыва къ пищи, кашлемь, жаромь, во устахь и вь гортани ощущаемыми. Всъ же оные припадки совершенно исчезали, когда онъ переставаль употреблять ртупь внутренно; а язвы гортанныя и шишки проходныя одними внъшними средствами, безъ вну-

внутренняго ртути употребленія, легко врачевалися; как и примъры сіе доказывающіе, вы посльдующих примъчаніях о любострастной жабь, вычислены будуть. Правило, от многих повторяемое о перемън ртути, на какой ніесть другой искусством пріуготовленной составь, вы таком случав, когда бользнь безпрерывно вы одномы положенім продолжается, вы практик т. Пленка, по собственному его признанію, никогда нужно не было; да и вы обываленномы случав едва ли оное могло бы приличествовать.

- 9. Стран 15, N) 1. Нъкоторые писатели думають, что любострастная бълая грыжа вперьвые оказалась въ 1540 году; но Александръ Венедиктъ примътиль оную еще въ 1493 году, какъ то доказываетъ Галлеръ въ вивлючкъ дъятельнаго врачевства. зри Томъ 1. Стран. 475. А та бълая грыжа, о коей пишетъ Бекетъ, якобы оная въ Лондонъ еще въ 1340 году примъчена была; имъла, какъ кажется, свое начало отъ одной похотливой нечистоты; по тому что весьма легкими лъкарствами совершенно врачуема была, какъ сте доказываютъ философическтя дъянтя, а особливо врачи Лезеке и Геклеръ то же подтверждаютъ.
 - 10. N. 2. Бълая грыжа называется gonorrhoea. Сте наименованте сложено изъ греческих в словь убил съмя и евю теку и но какъ въ любострастной бълой грыжъ, то-

кмо клейкая слизь или мокрота, а не съмя изъ мочеиспускателнаго ствола, каплями вонь истекаеть; то въ разсуждени сего лучше бы назвать оную другимъ греческимъ же сложеннымъ словомъ, а именно, leucorrhoea viriris т. е. течене бъли мужское. Что жъ настоящее съмя въ случат бълой грыжи отнюль не истекаеть; сте доказывается тъмъ, что подверженные сей болт могутъ свободно выбрасывать съмя. Тожъ самое и другими доказательствами подтверждается.

11. — N. 3. Г. Пленкъ имълъ случай раздроблять на части мертвое тъло воина скончавшагося от груднаго колотья, копорое было сопряжено съ жестокою бълою грыжею: при чемь онь видьль весь мочеиспускательной стволь покраснъвшій и желтую слизь исшекающую из скважинокъ ствола. Однакожъ онъ нигдъ тамо не нашелъ никакой язвы. Тожъ самое недавно примътиль и врачь Столль, который вы мертвомъ трупъ, любострасшною бользнію зараженномъ обръль малое воспаление мочеиспускательнаго ствола, простиравшееся отв устья онаго на два дюйма далье, также и предв самою плешкою. Язвы же нигде более не обрешалися: всв прочія части ствола, равно какъ ядра и пузырьки съменные были совершенно здоровые. Вр. Морганъ вычисляетъ многія членораздробленія надъ мершвыми шълами, бълою грыжею зараженных , учиненныя. Зри причины бользней послан. 40. 12.

12. Спран. 14. N. 4. Врачь Тоде ушверждаеть, что ядь былой грыжи не есть любострастная зараза, но особливаго рода ядовишая прилипчивосшь, не причиняющая обыкновенной любострасшной бользни, но производящая другія немочи, ртутью отнюдь неуврачуемыя. Прошивь доказашельсшвь, коими сей ученый мужь, старался подтвердишь оное свое мивиїе, т. Профессорь Рихтерь предлагаеть весьма важныя сомнънія. Г Пленкъ разсуждая о семъ, пишентъ шако: хотя и чувствую самъ о себъ, что я не въ силахь нахожусь вмышиванься вы то преніе, кое споль великте мужи между собою имъли о свойствъ бълой грыжи любострастной: однакожь любя исшинну, принужденным себя нахожу, сомиввашься объ упомяну помъ мивнии Тодія. Изв первышихв его доказашельсшвв, для чего бълая грыжа не есть любострастная бользнь, есть примъчание его слъдующее: что бълая грыжа лъчишся безъ ршуши, и чшо ртуть в сей бользни не пользуеть. Противь перваго доказашельства г. Пленкъ отвътствуеть тако: что любострастную заразу нельзя столь легко и удобно искоренить изъ друтихъ частей человъческаго тъла, какъ изъ мочеиспускательнаго ствола и изб рукава матки; слъдственно и бълая грыжа безъ ртути часто врачуется; чтожъ касается до употребленія ртути въ случать бълой грыжи, вь томь могу, говорить Пленкь, увърить всякаго, что я одними ртупьными впрыскиваніями совершенно излічиль многія білыя грыжи у мущинь, и теченія біли у женщинь; жотя вы прочемы и не вы силахы нахожусь отвышствовать на ніжоторыя другія его доказательства, изы коихы есть и сіє: для чего напр. білая грыжа на острові Отаитскомы еще и поныні непримічена, хотя любострастная болізнь давно уже многихы людей тамо заразила? Зри Тодія врачебную и Рихтерову ліжарскую Вивліотеку.

13. — N. 5. Крайне должно различашь бълую грыжу любострастную отв нелюбоспрасиной. Ибо Пленкъ видъль испарение или истечение гнойное произшедшее отв одной токмо нечистоты дътородных в частей; а имянно, отв природной незалупы бывшей въ прехавшнемъ младенцъ. Тожъ самое примышиль Аликсь, который пишеть, что бълой грыжь подвержень бышь можеть всякь тоть, кто имъеть соите съ женщиною страждущею шеченіемь острой и вакой были, хотя бы оная была и нелюбострастная. Вр. Вгить видьль былыя грыжи приключившияся ошь ломоннаго вещеснва, въ мужескомъ дътородномь удъзасъдшаго. Офтердингерь примътиль бълую грыжу причиненную желчными нечистотами, въперьвых в пищеприемных в стезях в скопившимися. Брендель утверждаеть, что ядовишых в мокрошь истечение, из в мочеиспускашельнаго ствола бывающее, есть припадокъ препрекрашившагося почечуя. Фордись, Соважь и другіе славные мужи примъшили, что гнойное шеченте мокрошь воспосльдовало ошь употребленія новаго пива, от шпанских в мухв и от острой пищи. Напоследовь Г. Пленкъ пишешь, что онъ самъ видъль, въ совершенно здоровомъ человъкъ таковое гноетеченте причиненное каменною бользнію мочеваго пузыря, которое иногда само собою прекращалось. Всъ шаковыя бълыя грыжи нелюбосшраспныя познаются тъмъ, что онъ недолго продолжающся: иногда гноешечение случаешся: иногда оно прекращается: что женщины съ мущинами, оному полверженными совокупляющіяся, отб того не заражаются; и что по большей части, по уврачевании бользни, отъ коей оныя произошли, сами собою и безъ лъкарсшвъ прекращающся; напрошивъ шого бълая грыжа съменная, или истечение съмени, причиненное без дъйств темъ сосудовъ выбрасывающихЪ, или неумъреннымЪ плошскимЪ соишіемь, или ночнымь невольнымь съмени испражненіемь, различается тьмь, что оть того случаются настоящее изсушение твла, оскулвние силь, и истечение настоящаго съмени примъчается.

14. Стран. 17. N. 2). а. Нѣкоторые врачи въ семъ случаѣ похваляють вытажку огуречника и воловьяго корня: другіе совѣтують употреблять вытяжку борца: а инные напослѣдокъ въ теченіи сего гноетеченія почитають полезною вытяжку дикаго аврана.

15. — 18. с) Внутреннее ртути употребленіе, хошя и перемъняеть ядовитость бълой грыжи въ мокрошу невдкую: хотя при томъ и защищаеть болящаго оть заразы любострастнаго яда, однакожь не совершенно врачуешь оную; ибо шаковая зараза сокрываешся въ клейкой слизи, изъложжинокъ мочеиспускательнаго ствола истекающей, и безпрестанно оную портить, подобно тнили; а ртупь въ семъ случав внутренно будучи упошребляема, почши никакой силы надъ оною не производить. Напрошивь того ртутьное впрыскиванье, посредствомъ насосца, легко разрушаеть какь оную слизь, такь и сокрывающуюся вы ней любострастную заразу. Отсюду явствуеть, что таковое впрыскиванье гораздо болъе способствуеть къ совершеному излъчению бълой грыжи; нежели внупреннее ртупи употребление.

16. Стран. 26. N. 3. Маленькія свычи, изь бараньихь струнь пріуготовленныя, вы мочеиспускательной стволь, когда онь есть чрезмырно сожать, легчы и улобные запускать можно, нежели восковыя свычи Гулардовы. сверхь того струны размятченныя, сильно вздуваются, болые разширяють дупло мочеиспускательнаго ствола, и слыдственно по своей гибкости долые вы ономы стволы, безы раздраженія, вы немы оставлены быть могуть. Но еще и симы предпочитаемы быть должны малыя свычи, внутри дупластыя, изы

изь упругой смолы содъланныя, кои не токмо разширяють мочеиспускательной стволь, но и вы немы оставлены будучи нимало не препятствують свободному мочи теченію. Вы прочемы крайне должно беречься, чтобы отнюды не употреблять свинцоваго катетера, или мочеваго выпускника, ртутью смазаннаго: ибо свинецы легко оты ртути преломляется; а свинцовый отломокы вы мочевомы пузыры оставшись, подаеть случай кы возрожденію каменной бользіни.

17. — 30. N. 2). Касашельно ноздреватаго рака, Г. ПленкЪ утверждаетъ, 1) что онъ посредствомъ перевязки, совершенно уврачевалъ мущину лътъ 32, имъвшаго ноздреватой нарость, величиною въ два кулака, бывшти на самой плъткъ и крайней плоти; 2) что онъ же видълъ другаго больнаго страдавшаго ракомъ чувственножильнымъ, которымъ вся средина дътороднаго мужескаго уда разъъдена и испорчена была; и для того, хотя весь дътородный удъ былъ отнять, однакожъ ракъ снова въ лъвомъ паку оказался, и болящему причинилъ гибель изсушентемъ тъла, отъ рака воспослъдовавшимъ.

18.— 32. N. 1. Часто у младенцовь и юношей, имъющихь самородную узкость или
сожатте крайней плоти, от нечистоты, подь
онымь покровомь скопившейся, незалупа воспаляется и гнойная мокрота оттуда вонь истекаеть: но оная будучи нелюбострастною,
масть III.

легко зрачуется омовентемь дътороднаго уда, состеящимь изы молока или смятчительнаго взвара. Вр. Аликсы видълы такой случай нады однимы деревенскимы мужикомы, который оты тлупаго бородобръя будучи считаемы зараженнымы любострастною бользитю, моглы бы быть подвержены разводу супружества, если бы сей мужы не обыснилы судьямы, что оная бользиь не была заразительною. Зри лъкарскія его примъчантя кн. 11. стран. 64.

19. — 42. N. 3). Перьвый, сколько извъстно, Гиршель совътуеть прививать бълую грыжу, въ случав зашверделости яичекъ. Образецъ или способъ прививантя оной, отъ него предлагаешся слъдующій; а именно, маленькая свъча запускается въ мочеиспускательной стволь мущины, бълою грыжею ядовишою зараженнаго, и оная въ немъ оставляется чрезв нъсколько часовв, поколъ таковая свъча хорошо бълогрыжным веществомъ напоишся; и шогда оную ошшуда вынувши немедленно вкладывають вы мочеиспускашельной стволь другаго мущины страждущаго бользнію, от прекращенія былой грыжи произходящею, и въ ономъ чрезъ 4 или 6 часовъ содержишся, поколъ жаръ и нъкошорые другіе припадки, бълой трыжь свойственные, окажушся. Такимъ шо образомъ Вр. Офдеркирхень впускаль маленькую свычу, любострастнымь ядомь напоенную, въ мочеиспускательной стволь 30-льтнаго воина страдавшаго запвердълою окрыплостью лываго ядра, которое было величиною въ два кулака, твердо какъ дерево; болъло токмо во время прикосновенія; причиною же сего была бълая грыжа, за 4 года предъ тъмъ въ немъ прекрапившаяся. Онъ ту свъчу въ стволъ больнаго оставиль чрезь 7 часовь; по прошесшвій коихь бълая грыжа купно сь обыкновенными своими припадками оказыващься начала; которую помянутый врачь, двумя вновь на другой день запущенными малыми свъчами, привель до такой степени, что бълогрыжный гной подобно струи вонь истекашь началь; а по шомь уже онь сію 60лъзнь лъчиль по правиламь искусства. По умаленіи же онаго гноешеченія примъшилъ онь, что и болящее яичко вь самомь дълъ величиною умалилось; и для того онъ учиниль новую прививку, и повторяль дотоль, поколъ зараженное яичко содълалось столь мало, что съ другимъ здоровымъ совершенно въ величинъ и мягкости сравнялось. Послъ чего сей опышь онымь же врачемь въ бользняхъ яичекъ весьма часто и всегда съ хорошимъ успъхомъ былъ повторяемъ. Однакожъ прививка учиненная посредством добраго бълогрыжнаго гноя ръдко была удачна; ибо у премногихъ больныхъ отъ того бълая грыжа насшоящая не воспоследовала, а у некоторых оная оказалась токмо мокротная, настоящую бользнь не искореняющая. А какъ вЪ M 2

въ частной врачебной практикъ бълогрыжная прилипчивая зараза не всегда обрътается: въ разсужденти сего, по совъту врача Ланге, малыя свъчки числомъ 7 любострастнымь ядомъ смазанныя, и сухою хлопчатою бумагою обверченныя, чрезъ 4 или 5 мъсящей всегда хранились въ банкъ хорошо закупоренной. При всемъ же томъ изъ числа оныхъ свъчь только одна произвела прививочную бълую грыжу, которая однакожъ вспухшее и болящее яичко совершенно разбить не могла.

20. стран. 49. N. 3. Врачь Цуберь въ мертвомь трупь одного старика, жившаго прежде невоздержно, по разръзанти мочеваго пузыря, нашель вы ономы великое ноздреващое шъло, возродившееся изв самой предсшашельной желазы, которое наполняло всю впадину онаго пузыря, выключая токмо дно онаго. Оно при своемь началь было швердо, прочая же онаго часть мало по малу казалася мягчъ, и ни къ одной споронъ мочеваго пузыря не приросшала. А какъ отъ того жЪ пъла шейка онаго пузыря разширена была, то отв того происходило, что моча подъ онымь пъломь безпрестанно вонь истекала. Таковая затверделость предсташельной жельзы, любоспраспною заразою безпрерывно раздражаема будучи, купно со прочими сосудами и чувственными жилами, вь вышеописанное ноздреватое тьло превраmuтилась. Зри Диссертацію о бользняхь мочеваго пузыря. Страсб. 1771.

21. — 53. N. 2). Таковое съчение заднято прохода, надъ нъкошорымъ больнымъ съ хорошимъ успъхомъ произвелъ въ дъйсшво вр. Брамбилла, какъ о семъ свидъщельствуетъ вр. Фонъ Свитенъ въ своихъ толкованияхъ Том. V. стран. 45. Вр. Шарпъ четыре раза видълъ заднюю кишку столь сокращенную около задняго прохода, что у одного изъ таковыхъ больныхъ дупло оной кишки едва могло въ себя вмъщать стволь гусинаго пера.

22. стран. 54. N. 1). Врачь Деазь доказываеть многими примъчаніями, что опухоли и наращения любострастныя, около задняго прохода случающіяся, и отб повтореннаго слиношеченія, либо не совстмъ искореняющся, либо не совершенно врачующся. А Г. Пленкъ свидътельствуетъ о себъ, что онъ самъ премногихъ больныхъ, таковыми опухольми страдавшихЪ; обыкновенными своими средсшвами совершенно уврачеваль чрезъ 3 или 4 недъли. Однакожь онъ сознаешь и то, что врачевание было безуспъшно, когда онъ вмъсто щолочной воды, для таковыхъ наращеній употребляль адской камень, зеленой купорось, или сурьмовое масло. Вр. Гардингерь видъль шаковыя же наращенія столь зашверделыя, что оныя никакими разведающими лъкарствами истребить не возможно было; M 3

было; но когда оныя посредством луку, вы маслъ разваренаго сперьва были размягчены, а по том съ верху присыпаемы порошком козацкато можжевельника, то от того совершенно изчезали.

23. -- 55. N. 3). Вр. ПленкЪ пишетъ, что онъ недавно видълъ въ больницъ беременную женщину, у коей устье задней кишки обложено было наращениемъ величиною дъшскую головку, сосшоящимъ изъ пухлинъ вь длину продолжающихся болье чымь на 6 дюймовь, шакъ что оная больная отнюдь не имъла испражнентя низомъ, и отъ жестокой боли часто днемь и ночью страдала судоргами и корчею; и для того на другой день по приходъ ея въ больницу, оное наращение похожее на превеликую голову цвъшной капусшы, возлъ самаго прохода ножницами отръзано было. Кровотеченте при томъ было не велико: судорга послъ сей операціи совершенно прекрашилась, и болящая чрезъ внутреннее ртути употребление вскорѣ выздоровѣла. Но спустя не много послѣ того, приключился ей кровавый понось, бывшій тогда в осенное время повальнымь; и хошя она шогда жъ родила благополучно: однакожь посль родовь впала въ глубокій сонь и скончалась.

24. — 57. N. 4). Вр. Соважь во своей носологіи дълаеть примъчанія о томь, что оть употребленія взвара стебельковь песьяго грозда грозда иногда скрышные наховики любосшрасшные наружу оказывались. Том. II.

спран. 549.

- 25. 58. N. 2). Г. Пленкъ, посредствомъ прижиганія, чрезь з или 4 недъли весьма удачливо врачевалъ многіе паховики, коихъ онъ отнюдъ не могъ разогнать ни пластыремъ ни мазью ртупьными. Онъ утверждаеть, что паховики, однимь факимь камнемъ прижигаемы будучи, иногда чрезъ полчаса совершенно исчезали. Боль ошь разывдающаго лъкарства была не велика: язва отъ того никогда худая не случалася: и паховики мало по малу загноившись, совершенно исчезали. Но когда, по совъту другихъ врачей, большая часть адскаго камня чрезъ 12 часовь, или и того долве, къ паховику приложена будучи, на ономъ оставлена была, то отб того жестокая боль, воспаление и лихорадка больному приключались; иногда ошь того паховикь превращался вы антоновы отонь; а всего чаще случалась язва великая, во всъ стороны кругомъ распространяющаяся, весьма прудно врачуемая, иногла въ язвеннаго рака премъняющаяся; какъ то сей же врачь многократно в больницахъ, гніючимь воздухомь наполненныхь, видъль собственным опытом в.
 - 26. стран. 78. N. 8). Г. Пленкъ пишеть, что у одного мущины, который у себя имъль любострастнаго паховика чрезъ цъ-

лыя 17 льть сряду; напосльдокь оный вдругь содьлался величиною болье трехь кулаковь; вы прочемы хотя былы весьма тверды, неравены, и не причинялы никакой боли, однакожы болящаго погубилы изсушентемы соковы и оскудытемы силы тылесныхы. Вр. Питшены видылы, что любострастный паховикы внезапно превратился вы ноздреватато, грибу подобнаго рака, величиною сы человыческую голову; оты чего болящий, пришеды вы оскудыте соковы и силы, быдственно погиблы. Зри дыяте практическихы случаевы о яды. ч. VI. стр. 5.

27. — 62. Гл. II. Соважъ пишетъ, что у одного мущины, любострастнымъ ядомъ зараженнаго, все чрево было чрезмѣрно вспух-шее, и брюшный закожный тукъ былъ чрезмѣрно затвердѣвшій; но что по употребленіи ртутьныхъ лѣкарствъ и послѣ вторичнаго смазыванія чрева неаполитанскою мазью, вся твердость и опухоль чрева совершенно исчезла. Носологіи томъ. II. стран. 490.

28. — 65. N 3. Г. Пленкъ пишетъ, что онъ недавно уврачевалъ многіе лишаи при-ключившіеся одной женщинъ на груди, рукахъ и ногахъ, посредствомъ смыванія оныхъ ртутьнымъ составомъ. Вр. Фаберъ и Шмуккеръ предлагають многіе примъры лишаевъ причиненныхъ скрытною любострастною заразою. Зри лъкарскія письма І. 106.

- 29. 66. N. 2. Вр. Кеглерь видъль въ больницъ учрежденной въ Неаполъ для лъченія младенцевь, головными струпьями зараженных в, что в воной находилось датей числомь 400; изъ котораго числа было 283 таковыхв, кои произошли отв родителей, любострастною бользнію зараженныхв, и вь той же самой больниць пользованныхв. Врачь Розеншшейнъ утверждаеть, что головныя струпья, кои посредствомъ гребешковь, шляпь, или колпаковь отводного больнаго другому сообщающся, сушь любосшрастнаго свойства; ибо оно внутреннимо и внъшнимь употреблениемь ртупьной водки фон-Свишеновой врачеваль жесшокія головныя парши. зри руководство къ познанію и врачеванію дъшских бользней стр. 662. Г. Пленкъ счаспливо лъчилъ многихъ больныхъ и взрослыхъ, струпья головныя имъвшихъ, внутреннимъ камединной ртути употребленіемь, присоединяя къ шомужь и омовеніе тлавы посредствомъ водянато ртупьнаго раствора, а иногда и безъ онаго.
 - 30 67. N. 3. БернардинЪ Томитанусъ писатель жившій почти около ста льть по открытіи любострастной бользни, говорить тако: протекших выковь люди видьли, что у многих всь зубы вонь выпадали; а нынь рыдко сте видимь; на противь того весьма часто примычаемь, что у многих власы, брови и брада низпадають. Антонь М 5

Муза Брассаволь примъчаеть, что у нъкоторыхь людей ногти, власы и зубы оть любострастной бользни падали. зри фонь Свитена толкован. том. V. стран. 406.

31. стран. 68. N. 1. Вр. Раймондъ предлагаещь слъдующее примъчание: жена 50 льшь имъла очи чрезмърно вспухшія и покраснъвшія, слабое зръніе, около очей не было ни ръсницъ, ни бровей, ноздри у ней были зіяющія, вонючую мокроту испускающія, чело сморщенное, вся голова плъшивая, нижнія ушныя части чрезмърно толстыя, вся кожа на шълъ была обнаженная от власовъ, лоснящаяся, шолсшая, жесшкая, шероховашая, во многихъ мъсшахъ зашвердъвшая, зудь по всему шълу равномърный, шяжелое дыханіе, духь изо рша исходящій вонючій, тягость вы головь, и тупый слухы. Мужы же ея быль заражень любострастною бользнію, которая и была причиною описанной бользни его жены. И такъ когда оной больной предписаны были ртушьныя лъкарства, шо по употреблении оных в чрез в цълыя два мъсяца, больная совершенно выздоровъла, кожа у ней здълалась гладкая и мягкая, волосы на головъ выросли, зрън и слухъ получили прежнюю свою силу и дъйствіе. Видь проказы въ флореншинской больницъ с. Евсевія, виъщнимь употребленіемь сулемы врачеванный, кажется быть любострастнаго свойства. Зри сочинение о бользияхъ опасных в стран. 357. 32.

32. - N. 2. Врачь Шиллингъ говоришъ въ книгъ о проказъ спран. 39. и 40. что ничто столь часто не случается, какъ сопряжение прокаженнаго и любострастнаго яда вмъсшъ; ибо больные, проказою зараженные, какъ въ началъ, такъ и въ продолжении бользни, чуднымь образомь возбуждающся къ частому соищію; и по тому безпрерывно раздражаемы и поощряемы будучи, весьма часто совокупляются; и тако какъ сами сообщающь прокаженной ядъ другимъ, такъ и отъ другихъ заимообразно любоспрасшнымь ядомь заражающся. Бользненные же припадки сихъ объихъ заразъ сушь найпаче язвы ракомъ пораженныя, на дъпородных в частях в случающияся, кои сопропивляющся дъйствію всякаго рода лъкарствь. ВЪ такомъ случат сей врачь испытываль упошребление ртупи; но всегда видълъ худыя отв того слъдствія, и произшедшіе бользненные припадки; и изъ многихъ опытовь узналь напоследокь, что ртуть ко искоренению прокаженнаго яда есть вовсе неспособна: что проказа от употреблентя ртупи еще болъе ожесточается, и по большей части причиняеть весьма гніючій кровавый поносъ. Нъкошорые писашели думають также и то, что проказа древнихъ была не что инное, какЪ настоящая любострастная бользив, или что сія посльдняя возвимъла свое начало отв соитія мущины

щины съ прокаженною женою. Однакожъ надлежить въдать, что настоящая проказа не заражаеть дътородных в частей, ртутью не врачуется, и давно уже, еще прежде познанія любосшрасшной бользни, врачамь была уже извѣсшна.

- 33. стран. 71. N. 3). Ланжъ въ кн: о окобольни стр. 75. предлагаеть сльдующую повъсшь: одинъ мясникъ, бълою грыжею спрадавшій, за однимь разомь выпиль нъсколько унцовъ терпентиннаго масла, въ надеждъ, чтобъ тъмъ скоряе ему освободишься от сей его бользии. Послъ шакого пріема въ самомъ дълъ скоропостижно оная прекратилась; но оба глаза у него вдругъ поражены были прежестокимь воспалениемь; чего ради врачь хошъль было, посредствомь свъчи смазанной бълогрыжнымъ тноемъ, привишь ему бълую грыжу; однакожь больный оть того отрекся, сказуя, что онь легчайшимь способомь снова произведеть оную. И такъ посътивъ вторично ту же женщину, ошь коей онь досталь прежнюю бользнь, на другой день самимъ деломъ почувствовалъ въ себъ преизобильное течение гнойнаго вещества, вскоръ воспаление очей умалилось, и однимъ внутреннимъ камединной ртути упошреблениемь, чрезь б. недъль совершенно ошь объихъ оныхъ бользней выздоровъль.
- 34. 74. N. 2. Вр. Фонъ Свишень, однимъ шокмо внушреннимъ упошреблентемъ сулемы,

лемы, совершенно излычиль пятно роговой очной оболочки.

- 35. 77. N. 1). Вр. Розенштейнъ въ кн. о дътск. бол. стран. 643. Фабръ о любостр. бол. 1. 12. и Петитъ, совершенно уврачевали свищъ бывшти въ обоихъ слезныхъ мъшечкахъ, и язву въ нюбъ, отъ скрытной любострастной болъзни произшедштя, посредствомъ ртупьнаго натирантя.
- 36. 78. N. 2. Г. Пленкъ пишеть, что онь видъль бъльмо, одному воину приключившееся от бъльмо прыжи, совершенно истребленное употреблентемь камединной ртутии; а Соважь утверждаеть, что бъльмо от любострастной заразы произшедшее иногда отвращается водкою, въ коей сулема растворена. Но иногда оба сти средства не имъють желаемаго успъха.

37. — 79. N. 1. Вр. Цакуть пишеть, что онь видъль любострастную слепоту, вскорь посль нечистаго соит приключив- туюся, и сопряженную сь язвами, пупырышками и болячками по всему лицу. Вра-

чебн. практ. сотн. V. Примъч. 49.

38. — N. 2. Вр. Бургавь, Гейстерь, Боннеть и Смить пишуть о любострастной сльпоть, уврачеванной посредствомь слинотеченія. Зри Шмуккера лькарск. письма. ч. II. 24.

39. — 80. N. 3. Г. Пленкъ употреблениемъ камединной ртути уврачевалъ мнотихъ глухихъ, отъ прекращения бълой гры-

жи слуха лишившихся. Вр. Тринка вЪ кн. о глухоть собраль многія примъчанія отомь, что любострастная глухоща ртутью отвращаешся.

40. — 82. N. 2. Вр. Тоде въ лъкарск. вивліонек в приводить случай такой: одинь юноша имъвшій бълую грыжу или шанкрЪ, случайно и чрезъ весьма малое время принуждень быль употребить свой карманной платокь, прикрывь онымь свой болящій удь, жалья чтобь незамарать чистой своей рубашки; по томъ получа другое полотенце для перемъны, позабывши немедлънно положиль тоть же свой платокь вы кармань, и употребляль его по томь при сморкании носа; от чего вскоръ та жъ самая бользнь оказалась и въ самомъ носу, которая существовала въ дътородныхъ его частяхъ; по чему онъ и назваль ее шанкромъ носовымъ.

41. — 85. N. 2. Вр. СеверинЪ вЪ кн. о скрышномь свойствь нарывовь, Неапол. 1763, представиль изображение всего лица страннымь образомь обезображеннаго закоренълою любострастною бользнію. Г. Пленкъ видълъ одну деревенскую женщину, у которой весь нось совершенно исчезль от застарьлой любострастной бользни, а вмъсто онаго было шокмо маленкое возвышение, величиною едва съ горошинку, съ малымъ такой же величины отверствемь; уста же и губы у нее были чрезмърно сожащы, и почти срослися такъ,

такъ, что едва можно было запустить въ роть последній составь перста мизинца.

42. — 90. N. 2. Вр. Гавеманъ думаетъ, что оскудъние добрыхъ соковъ, выйными зобами причиненное, весьма часто происходишь ошь перемънившагося или переродившагося любострастнаго яда. Зри соч. о любо-

стр. многообразн. болъзн. стр. 55.

43. — 92. N. 3. Г. ПленкЪ пишетЪ, что онъ многихъ больныхъ страдавшихъ долговременными горшанными язвами, чрезъ нъскольно недъль совершенно уврачеваль, смазывая язвенныя мъста перушком в обмоченным в вь ршушьную масшихинную ессенцію; и чшо оные больные отв долговременнаго употребленія камединной ртути, сулемы, мореной ртути, от натиранія ртутью, и от слиношеченія ошню дь не получали никакой пользы.

44. N. 4). Вр. Меца и Стракъ пишутъ, что испорченное и невозможное глотание, сь настоящими признаками, оть скрытной любоспрастной бользни приключившееся, ртутью совершенно уврачевано было. Зри примъч. о болъзи. съ пятн. стр. 233. Вр. Дункань видъль испорченное глошание послъдовавшее по излъчении любострастных в гортанных в язвъ. Зри врачебн. Случ. Стр. 176.

45. — 93. N. 5. Вр. Руссель весьма похваляеть корку волчьяго перца въ любострасшной косшной боли и опухоли. Онъ доказываеть 16 примърами практическими, что

косшныя опухоли бывшія величиною съ турецкой оръхв, часто въ течени одного мъсяца сею единою коркою были разбишы и разогнаны: однакожь оная вы косшныхы наращеніях в мало принесла пользы. При чем в онь же описываеть два случая такія, гдъ была настоящая костевдица, которая благополучно отвращена тьмь, когда послъ приложеннаго адскаго камня бляшки гніючей кости отдълились, и по томъ уже оная употребляема была. Зри врач. примъч. 3. спр. 189. Вр. Рацуксь похваляень взварь стебельковь песьяго грозда для лъченія простых опухолей. Зри журналь врачеби. Т. 22. стр. 236.

46. — 95. N. 2. Вр. Морганъ видълъ старушку, у коей лъвая зашылочная косшь и ближайшая кв ней часть лбинной кости отв любострастной бользни сполько разътдена была, что мозго на три дюйма во поперечникъ, чрезъ сквозное отверсте быль виденъ такъ, что можно было, при испытанти бтснія боевой ручной жилы, явственно очами видъшь, что и самый мозгъ въ одно и по жъ самое время купно съ оною боевою жилою поперемънно то поднимался въ верхъ, то опускался внизь; мозговая же внъшняя оболочка была лоснящаяся и чистая. Зри причин. 60лъзни кн. IV. послан. 58. Вр. Либавій видъль, что у одной любострастной женщины вся правая височная кость, половина ближайжайшей тьменной кости, и мозгь даже до самых в пустырей, гнилью были испорчены а напосльдок в страждущая, бывь поражена смертельным в сном в бъдственно погибла. Вр. Трїоень и Сталпарт фонь Дервиль приводять примъры, что у одной любострастиной женщины отпомок в лбинной кости величиною в в нъсколько дюймов в, от средняго черепнаго тука от в послъдовала язва гнюсная, весьма вонючую сукровищу источающая. Зри врачебн. примъч. сотн. 1.

47. — 95. N. 2). вЪ АнатомическихЪ теапрахв можно видеть разныя коспи человъческія, разнымь образомь испорченныя. Напр. весь головный черень и всь личныя косши, костевдицею такъ разъвдены, что подобно решешу, многочисленными сквозными дирами, власно как буравом в проколоты быть кажутся. Вся связь костей таза даже у младольтных в дътей, найдена дирава и гнилью развъдена, подобно дереву гнилому и черьвями расточенному. Всъ кости въ тълахъ человъческихъ найдены совершенно диравыя и гнилью пораженныя сполько, что опнюдь не льзя было оных в соединить вмъсто. Всъ таковыя гнили и костетлицы причиняются любострастною заразою закоренълою, приобръшенною, или наслъдственною. Врачь Нуккї усь на одномь изъ шаковых в костяков положиль надпись слъдующую: Amor intimis inhæret medullis. т. е. Любовь впечатлъвается самимъ нъдрамъ и мозгамъ. Желающіе въ семъ болье удостовьриться, могуть читать сочиненія врачей, а особливо Кнолла, Гофмана, Олитиа, Шезелдена, Моргана, Нуккія и проч.

- 48. 99. N. 4. Исторіи о костяхь, любострастною заразою размягченныхь, и оть того преломившихся, описаны во врачебныхь Аглинскихь примъчаніяхь. Лонд. кн. IV. стр. 216.
- 49. N. 5. Врачь Рейхель описываеть костевдицу бедровой кости, которая сама собою переломилась. Зри примъч. врач. кн. III. 7. IV. стр. 580.
- 50. 100. N. 4. Г. ПленкЪ описываешЪ случай такой: одинЪ больный имълъ опухоль въ лъвомъ яичкъ безболъзненную, болъе года от прекращентя бълой грыжи ему
 приключившуюся; от чего онъ часто мучился ячменцемъ, на очныхъ въкахъ у него
 нараставшимъ, и опухольми членовными, а
 особливо на внъшней части лъваго, и на внутренней сторонъ праваго колъна бывшими,
 кои ему причиняли жестокую боль, а при
 томъ раъли и краснъли. По употребленти
 камединной ртути, бълая грыжа прежде того прекратившаяся, снова отрыгнулась, пухлина яичка и всъ прочтя костныя опухоли чрезъ 6 недъль совершенно изчезли.

51. — 116. N. 3. Вр. Стеркъ примътилъ воздушно - водяную бользнь машки у двухъ жень. Зри годъ врачебн. II. стр. 204. Онъ пишеть, что объ оныя женщины чрезь многіе годы сряду спрадали жестокою любоспрастною бълью, такъ что испекающая влага была совершенно гнойная, весьма вонючая и столь острая и вдкая, что отв оной весь рукавъ машки и внышнія дытородныя части совершенно разЪфдены и испорчены были. Моча всегда исшекала съ превеликимъ шрудомъ. Напослъдокъ по упошребленіи многих в лъкарствв, у одной изв нихв течение бъли совершенно прекрапилось, и язвы на дътородных в частях вывшія зажили; а у другой бъль умалилась, и меньше прежняго ее обезпокоивала. Однакожъ объ онъ послъ шого въ себъ чувствовали безпрестанной жарь сь болью вь нижней чрева части, иногда великую тоскливость, позывЪ власно какъ бы къ испражнению низомъ, и боль въ брюхъ къ рукаву машки и къ пахамъ простирающуюся. За симъ часто слъдовали легкие омраки, шакъже частые и вонючіе въщры съ щрескомъ и великою силою изъ машки переднимъ проходомъ вонъ исходящіе; а за оными вскоръ мокрошы гнойныя, съ волоконцами смъшенныя, подобно огню жигучія, и весьма ъдкія вонь исшекали. Но и сте теченте мокрошь вскоръ прекращалось. По прошестви 1, 2, или з дней снова шъжъ H 2 при-

припадки возвращались, въпры исходили, тнойныя и вонючія мокрошы исшекали, и власно какъбы нъкоею силою вонъ изгоняемы были. Все же сте чрезв нъсколько недъль сряду продолжалось. Тогда опухоль весьма твердая, упругая и полукруглая вЪ нижней чрева части оказываться начинала; но по исходъ въпрово и испечении мокроть чрезь рукавь машки, всегда оная умалялась и становилась мягчъ. Величина сея опухоли мало по малу прибавлялась, и чъмъ больше оная спановилась, пъмъ меньше было въпровь, кои напослъдокь и совсъмь прекращались, и тогда уже оная опухоль получала скоропостижное и явственное приращенте. Объ же тъ больныя имъли безпрерывную лихорадку, и около вечера всегда у нихъ дълались великій и частый ознобъ и потягота, за коими сильный жарь и неутолимая жажда слъдовали; от чего безпокойный сонь, бръдь, судорга и корча сухихь жиль приключались. На последокъ по долговременномъ изсушении тъла, объ оныя женщины бълственно погибли. До смерти же ихъ въ объихъ припадки были совершенно одинакія. Испражнение низомъ всегда было свободное: но моча всегда истекала съ прудомъ, была вонючая, а иногда и совершенный быль мочи запорЪ.

Въ трупъ первой больной, у коей бъль прекратилась отъ употребления лъкарствъ,

по вскрыти мершваго тьла, найдена матка твердая, упругая, величиною св человъческую голову. Какв скоро матка ножичкомъ проръзана была, то извея дупла весьма вонючий воздухв св великою силою вонв выскочиль, вв самой же ея впадинъ найдена тнойная и весьма вонючая мокрота. Все вещество матки было тонкое, плънчатое; а вся внутренняя ея поверхность язвами покрыта и антоновымь отнемь поражена была. Внытее рыльце матки было совершенно затвердъвшее и сростшесся, а внутреннее тнилью развъденое. А вв рукавъ матки найдены разныя наращентя ноздреватыя, св премногими знаками, послъ зажилыхв язвв оставшимися.

Въ трупъ другой больной найдена машка вспухшая, власно какъ надушая, упругая, величиною тораздо меньше противъ первой; а во впадинъ ея такая же гнойная мокрота, съ великимъ количествомъ весьма вонючаго воздуха. Вся внутренняя ея поверьхность была покрыта гніючими и гнусными язвами, и отъ гнили разътдена. Рыльце матки не было сростшееся, но токмо завалено скипъвшеюся и затвердъвшею кровію, а при томъ и отъ гнили попорчено. Весь рукавъ матки и внъщнія дътородныя части язвами покрыты были.

52. — 120. N. 3. Вр. Соважь носол. том. II. стр. 540. пишеть, что у одной любострастной Н 3 жен-

женщины была опухоль сосцовь сь язвами, величиною больше дъшской головки, кошорая чрезъ употребление ртупи вскоръ содълалась менъе кулака; но какъ оную лъкарствами отвратить не возможно было, того ради по необходимости весь оставшій ракЪ быль искусствомь выръзань и отнять. Онъ же видъл у любострастной дъвицы двъ опухоли въ сосцу, величиною съ куриное яицо, сопряженныя съ жестокою болью и опухолью бывшею въ подкрылочныхъ жельзахъ, и съ язвами во ршу. Всъ же оные припадки исчезли от употребленія сулемы во водко расшворенной. Вр. Бирхенъ въ книг. о ракъ, ушверждаешь, что всякія зашвердьлости зобныя причиняющся любострастным ядомъ: что ракъ зобный и любострастный есть одного и того же свойства: и что онь врачуешся ршушью, коей прочіе виды рака сопрошивляющся.

- 53. N. 4. В. Фогель пишеть, что онь видьль наращение на сосцахь ноздреватое, взваромь сарсапарели уврачеванное. Зри лъ-карск. опытовь сборь 1. отдъл. 26.
- 54. 121. N. 5. Вр. Биргенъ подшверждаеть, что онь однимь употреблентемъ ртутьной водки, сложенной изъ 4 гранъ сулемы и одного унца хлъбнаго спирта, совершенно уврачеваль многте виды рака, антоновымъ огнемъ пораженнаго. Онъ думаеть, что тоть ракъ, который номою назывался, и слу-

случается у дътей на губахъ, есть любострастнаго свойства, и слъдственно ртутьною водкою оной лъчить можно. Таковые виды рака, на мошенкъ и внъшнихъ дътородныхъ женскихъ частяхъ случающеся, тъмъ же самимъ средствомъ совершенно уврачеваны были. Зри сочин. его о признакахъ рака. Стр. 82, 84, 120.

55. — 125. N. 4. Вр. Столль пишеть, что оть унотребленія ртупи, нечистоты вы желудкь умножаются, или производять наныщеніе и опухоль живота. Зри способь вра-

чев. бол. ч. П. стр. 266.

56. — гл. V. N. 2. Монро вычисляеть примъры лихорадки четверодневной, причиненной любострастною бользийю. Тщетно оть оной предписаны были лъкарства противулихорадочныя; ибо оная лихорадка оть таковыхъ лъкарствъ еще болье усиливалась; по тому что будучи любострастною, сопротивлялась всъмъ онымъ средствамъ; но какъ скоро мореная ртуть употреблена была даже до произведентя слинотечентя, тогда оная лихорадка совершенно прекратилась. Подобные сему примъры представляются и отъ врачей Валлонтуса и Деидтера.

57. — 126. N. 4. Когда перемежающаяся лихорадка не происходить от любострастной заразы; но есть токмо случайнымь ея припадкомь: тогда надлежить соединять вмысто и лыкарство противулихорадочное и про-

тивулюбострастное, съ тъмъ намърениемъ, дабы объ бользни вдругъ отвращены были. Г. Пленкъ утверждеть, что онъ отъ таковаго сопряжения лъкарствъ видълъ весьма счастливые успъхи. Зри сочинен. Врач. Верлгофа и Тедена.

58. — 127. N. 3. Вр. Риверій пишеть, что когда одному больному ошняли руку, и рана зажила, то вдругь последовала жестокая повсю ду судорга; чего ради отняли и оставшую часть руки: но тщешно. Врачи подозръвая, не сокрывается ли любострастная зараза въ самой крови, оставшись в ней от прекращенія когданіесть бывшей бълой грыжи; и для того предписали болящему ршушьныя лъкарсшва, коими произведенное слиношечение, совершенно прекрашило бывшую судоргу. Впрочемь поелику ртупью врачуется и повсюдная судорга раждающаяся отв разныхвиричинъ; то по мнънію Г. Пленка, и не льзя достовърно утвердить, въ самомъ ли дълъ описанная судорга имъла свое начало отв любострастной бользни?

59. — 127. N. 3. Вр. Розенштейнъ и Блокъ видъли 6 лътняго отрока страдавшаго почти чрезъ три года сряду припадками падучей бользни, въ неизвъстное время случающимися, также головными струпьями и гнилью внутрькостною въ хребетныхъ ручныхъ и ножныхъ костяхъ бывшею; который больный, камединною и мореною ртутью съ

дурнымъ духомъ смѣшенною и внутренно употребляемою, чрезъ 7 мѣсяцей безъ произведенїя слинотеченїя совершенно выздоровѣлъ. Язвы внутрькостныя зажили посредствомъ бальсамическаго ртутьнаго раствора и неаполитанской мази. Въ теченїи же онаго времени черезъ день сиживаль онъ въ тепловатой цѣлительной ваннѣ или купѣли.

60. — 128. N. 2. Вр. Соважь видъль 40 лъть мущину страдавшаго чрезь многіе годы сряду язвами дъпородных в часшей, который еще сверхв того посль былой грыжи, безразсуднымь образомь прекращенной, быль пораженъ несовершеннымъ параличемъ нижнихъ удовь, такъ что едва онь на ногахъстоять могь. По совъшу лъкаря онъ съль по поясъ въ ванну теплую, съ свинцовыми бълилами смъшенную; ошъ чего въ немъ совершенное нижних в частей разслабление воспоследовало. Тщешно сулема и прочте ршушьные составы чрезв цълые два мъсяца употребляемы были. А Г. Пленкъ видълъ 53 лътъ старика, любострастными костьными опухольми страдавшаго, который отв употреблентя шеплых Бадских водь, в Австріи, поражень быль параличемь целой половины шела: однакожъ посредствомъ взвара стебельковъ песьято грозда и камединной ршуши снова отъ оной бользни выздоровьль.

61. — 129. Гл. III. N. 3. Левелинг описывает головной черепь воина, страдавшаго Н 5 нъкогда любострастною бользнію, который по томь получиль падучую бользнь, и на по-

слъдокъ ошъ апоплексии умеръ.

62. — 131. N. 2. Многія бользни найболье ночью ожесточаются и усиливаются, какъ то лихорадки, боли, цынготныя немочи и проч. но всь таковые недуги особливыми своими признаками легко распознаются оть любострастных бользней. Вь прочемь извыстно и то, что и послыднія иногда ночью отнюдь не ожесточаются. Зри сочипен. врач. Триллера, Столла и Пленка.

63. — 135. Гл. VII. N. 2. Г. ПленкЪ видъль 2 полководновь, кои оба отв паховика, ртушьными лькарствами разогнаннаго, хромали на одну ногу и спрадали штагрою, или болью въ съдальной кости чувствуемою. Одинь изв нихв чрезв при мъсяца сряду оными припадками страдавшій, почти чрезЪ мъсяцъ совершенно вылъчился камединною ртупью и проносными лакарствами; а друтіе спрадавшій жестокою болью, въ съдальной кости, около 18 мъсяцей продолжавшеюся, на последок в получил желчную лихорадку, которая сперыва причинила то, что бользненное вещество засьло около болящаго мъсша; по томъ въ членосоединении возгноеніе, а за тъмъ костевдица и смерть последовали. Таковая хромоногая ходьба отъ сокращенія ли мышечных волоконь, или отв других впричинъ зависить? дальшему впредь изслъдованію предбосшавляется.

64. — 136. N. 3. Багливій пишеть, что онь долго льчиль больного страдавшаго шіагрою, и по тщетномь употребленіи самыхь лучшихь лькарствь, болящій быль безнадежень; но когда онь случайно о себь объявиль, что онь за 20 льть предь тьмы имыль у себя любострастные паховики, и что оные худо льчимы были: то тьмы и подаль подозрыте думать о себь, что и вы самомы дыль оны быль подвержены заразительной бользни. Чегоради какы скоро началь употреблять взвары сарсапарели, сурьму и прочія ртутьныя лькарства, то вы корошкое время оть своей бользни совершенно выздоровыль.

65. — 146. N. 4. Поелику ртупь гонить мѣсячную кровь, а слиношечение истощая соки у машери, и ушробнаго плода лишаешъ пищи; въ разсуждении сего многихъ врачей есть мижние такое, чтобь врачевание любоспрастной бользни всегда ошкладывать до того времени, когда роды окончатся, дабы ршушь не причинила выкидыванте или недоношение. Однакожъ поелику любострастный ядь ежедневно болье и болье заражаеть и машь и дишя; а что случается, что и безь употребленія ртути утробный плодЪ гнилью пораженный причиняеть выкидывание; въ разсуждении сего мивите г. Пленка есть сте, чтобъ беременнымъ женамъ давать камединную ршушь, и опытами подтверждаеть, что сей

сей пріятный ртутьный составь счастливо врачуеть любострастную бользнь беременныхь, отнюдь не причиняя выкидыванія; и что произведеніе слинотеченія и острыя ртутьныя лькарства, во время беременности не безопасно употребляемы быть могуть.

66. — 148. N. 4. ВЪ Парижъ есть нарочито учрежденный домЪ, откуда кормилицы, матерямЪ, дътей своихЪ воспытывать нехотящимЪ, посылаются. Весьма прилъжное отъ врачей сего дома прилагается старанте о томЪ, чтобъ ни кормилицы любострастныя, ни младенцы зараженные въ оной домъ принимаемы не были. Однакожъ случилось одиножды, что дитя любострастнымъ ядомъ зараженное ввърено было здоровой кормилицъ, отъ чего какъ та самая кормилица, такъ и другое дитя совершенно здоровое, отъ то вскоръ заразились. Зри Гардана опис. Учрежд. Дома о кормилицахъ въ Парижъ. 1775. стран. 16.

67. — 150. N. 7. Вр. Пленкъ ушверждаеть, что онь многимь беременнымь женамь, любострастною бользнію зараженнымь, во время ихь беременности, даваль камединую ртуть и видьль дьтей оть нихь рожденныхь совершенно здоровыхь. Однакожь пищеть и сіе, что одиножды видьль онь новорожденнаго младенца оть матери употреблявшей много ртути, во время своей беременности, у коего передняя часть выи

была

была такъ вспухшая, что величиною равнялась съ дъшскою головкою, и кошорый вскоръ послъ родовъ умеръ. Ршушь ли, будучи безсильна произвести въ зародъ слиношеченїе, причинила оную опухоль? Нъкошорые однакожь сомнъвающся, чтобы ртуть данная беременной могла проникнуть даже въ самаго зарода. Но вр. Левретъ примътилъ, что воды содержимыя въ младенческихъ оболочкахЪ, у тъхъ беременныхъ женъ, которыя въ продолжении ихъ беременности, ртутью наширали шъло, были песочнаго или свинцоваго цвъта: что онъ на красной мъди производили бълой цвъть: и что первородный каль дъшскій быль свинцоваго цвыта. Отсюду явствуеть, что ртуть от беременной машери преселяешся даже въ самыя нъдра упробнаго плода.

68. — 151. N. 2. Вр. Гулардь сочинен. лекарск. ш. П. стр. 19. описываеть женщину имерт на разных вы частях выбла сыпь сы пупырышками, прыщами и язвами. Мужь ея за 15 леть преды темы имель любострастные паховики и язвы на детородных выстания. Оная женщина посредствомы употребления ртутьных в лекарствы одиножды оты ея болезни совершенно исцелена была. По томы снова оты своегожы мужа заразившись напоследокы умерла оты своей болезни. По смерти же ея, мужь жиль еще 25 леть, отнюдь не чувствуя вы себе никакихы болез-

ненных в припадков в. Вр. Прессавен в в сочино о любостр. бол. Женев. 1773. стр. 22. описывает в также женщину зараженную любострастною бользый: утверждает, что муж оной жены вовсе не быль причастен той бользии: и примърами доказывает, что мущины здоровые, сообщаясь с зараженными женами, могуть быть свободны от сея заразы. Однакож в таковое мнън те требует дальшаго подтвержден я.

69. — N. 3. Г. ПленкЪ видълъ благородную девицу, любострастною кормилицею воснитанную, у которой на 13 году, когда надлежало бышь у нее вперывые мъсячному кровошеченію, внезапно вмѣсшо шого послѣдовало сильное шечение бъли преосшрой и весьма Бакой, св открыешимися головными язвами; что все посредствомъ ртупьных в лъкарствъ благополучно отвращено было. При чемъ онъ же ушверждаеть, что какь зараза оть воспы, кори и уязвленія бъшеной скошины: шакЪ равно и любострастный ядь могуть долговременно въ шълъ сокрывашься, поколъ явно откроются. Вр. Розенштейнъ подтверждаетъ то же многими наблюденіями и следующими примърами: 1) двулъшняя дъвушка заразившись от своей няньки, которая ее кормила пищею, сперьва во своих в устах в разжеванною, не прежде, какъ по прошестви 9 льть послъ того въ себъ почувствовала припадки отъ заразы происходящіе. 2) два младенца родные

ные брашья от кормилицы заразившись, не прежде въ себъ почувствовали оную заразу, какъ достигши уже 30 лъть. 3) отрокъ наслаждался совершенным вздоровьем даже до 11 году своего возрасша, по шомъ когда ему въ сте время привили воспу, впрочемъ весьма благополучную, тогда съ нею купно въ немь оказались и знаки любострастной бользни; ибо онъ прежде въ своемъ младенчествъ заразился от своей матери, которая вы самомы дылы ныкогда страдала французскою бользийю. Фонъ Свишена шолкован. m. V. стр. 385.

70. — 153. N. 1). Ожесточение бользней въ ночное время не во всъхъ любоспрастных в недугах в случается, по примъчантям в

вр. Пленка и Блокса.

71. — 154. N. 1). Вр. ГренгерЪ примъшилъ, что употребление ртути есть вредно цынгошнымв. Онв видълв, что отв одного золошника ршушьной мази, коею што одного салдата, любострастною и цынготною болъзными спрадавшаго, смазано было; слинотечение кровавое, опухоль десень, боль зубовЪ, весьма вонючая харкошина, обмороки и великая слабость приключились. Вр. Крамерь утверждаеть, что 400 салдать цынгошных от употребленія ртуши бълственно погибли. Вр. Гуларав примътиль, что два цынготные салдаты, будучи положены въ той же палать, гав лежали любостра-

страстные больные, ртутью льчимые, оть воздуха, испарентемъ слиноточащихъ зараженнаго, получили опухоль головы, сильное слиношечение, и весьма худыя язвы во рту. Вр. Гемпель испыталь, что ртупьныя наширанія чинимыя цынгошнымь, или цынтою вивств и любострастною бользными зараженнымь, произвели смершельныя приключенія; ибо оть ртути ланиты антоновымь огнемъ поражены были, и скорая смерть послъдовала. Вр. Михаелись опышомь подшверждаешь, что многіе цынготно - любострастные, от объих сих в бользней получили совершенное исцаление, посредствомъ соннато зълья, лъкарственной корки и купороснаго масла.

72. 159. N. 7. 1). 2.) Работники въ рудокопных в ршушьных в заводах в шрудящиеся весьма скоро ошь ртуши получають слинотечение; а шъ, у коихъ сего нъть, вскоръ поражающся дрожаніем всъх в членовь. Парныя бани, потовыя и проносныя лекарства суть въ семъ случав найлучшимъ средствомъ. На днъ ванны или купъли, даже и долговременно упопребляемой, всегда ршушь осшавшая обрътается. Ртуть также найдена и въ той купъли, въ коей сиживали больные страдавшіе дрожаніемь членовь причиненнымь оть поглощентя ртупьных в паровв. Вр. Муррай пишеть, что старики, отроки, и холоднаго сложенія мущины и женщины часто отв употре-

потребленія ртути дрожаніем в членовь; напрошивь шого люди горячаго сложенія, поелику въ тълъ ихъ ртупьные шарики легчъ и скоръе обращающся, найболъе слиношеченію подвержены бывають. Онь видъль салдаша, кошорый давно заражень булучи любострастною бользнію, отв долговременнаго ршуши упошребленія, пришедши въ крайнее исшощение, спрадаль еще ломошою, болью вь составахь, и язвами бывшими вь носу и на прочихъ тълесныхъ частяхъ, и всегда послъ упопреблентя ршути всъ оные припадки еще болъе усиливались. Но когда онъ тому больному ежедневно началь давашь сурьмы грань по 7, смышавь оную св золошникомъ сахару, прибавляя каждаго дня еще большее сего количество, а для питья взвау в деревь; тогда болящій чрезь нъсколько дней получиль понось, по шомь весьма сильно потвль; посль чего ломота умалилась, язвы присыпаемы булучи порошком ломаноса, качали испочать доброй гной, носовыя косточки тнилью пораженныя, по отдълении согнившихъ бляшекъ исправились, и болящій по прошестви немногих в недъль совершенно выздоровъль.

73. — 160. N. 3. Вр. Пейриллив похваляеть особливо щолочную летучую соль для врачеванія любострастной бользии. Но т. Пленкь одиножды самь испыталь весьма худое оть сея соли дъйствіе. Вр. Муррай Часть III.

пишеть, что когда онь по совъту вр. Пейрилна даль предписанное от него количество оной больному спрадавшему ядовищою и застарълою бълою грыжею; то от того болящий влругь почувствоваль прежестокій жарь при испускании мочи, которая вонь истекала, съ кровію смъшенная. Чего ради онбему предписаль пишь много клейкаго взвара, но на другой день бълая грыжа совершенно прекратилась, и лъвое ядро оказалось пораженное опухолью и воспаленіемь. Другому юношть, ошь язвь любострастной бользни жестоко обезображенному, онъ же предписываль сте самое лъкарство, хотя и съ большею противь прежняго осторожностью; но язвы при умножении боли начали воспалящься, и болящій споль сильно посковаль, что надлежало вовсе оставить упомянутое лакарсшво.

отд Бленіе III.

Алфавитное оглавление со держаний.

THE COLV.	стран.
eranno Y	85
Безгласте	-84
Безпрерывный позывь къ испражнению низом	131
Безсонница	130
ДОЛИ	136
Боль костная	140
boatsherhoe medent montoms	
Бользни внушрения	
Внъшнія	
Выйныя	
Горшанныя	
Грудныя - с с с	
— Дътородных в частей	
Женскаго поламичны выстанта	102
— Жень беременныхь	140
—— Закожныя	mox 762
Изнуоищельныя	
Костиная выполновый выни	92
Лихорадочныя	
Любострастныя внутреннія и вн	ьш- —
иїя	13. 122
— Машки имеры вонго сіноонта	-114
Младенческія - фусла	147
— Многообразныя	50 V 152
— Многосложныя	dq0154
Власть двиор частой киновом	28 men 8
Очныя - выда	-70
—— Паховыя — - dqo	
—— Предстательной жельзы —— Предстательной жельзы	
Ti potte in a mortalita in	50
Tipomomino and	Бо-
(2	TO STATE OF THE PARTY OF THE PA

e de la company	тран.
Бользни разслабляющія тьло	100
—— Скрытныя	128 151
—— СосцовЪ	117
— Судорожныя	126
Съменных	40
устныя .	86
Ушныя описка сопо- на Точест- Вынамина	80
Членовныя	99
Бълая грыжа	73
Бель - вышения	108
Бъльмо	78
Воздушно-водяная бользнь	116
Воспаление дъшор. Частей	106
Воспаление предст. жельзы	44
- Сосцовъ	117
ЯдерЪ	40
Востание плоти	35
Врачебныя предписанія и примѣчанія 162.	182
Тлавобольніе	130
Тлухота - на жоль	80
Тниль внутрь костная	96
Тноешечение задняго прохода	141
OTHOR - HARRIS ASSOCIA	_73
Ушное инвершена ининастродет А.	80
Жаба	90
Загноеніе очной камеры	76
ЗадохЪ	137
2	34
Запоръ мочи	
Затвердълость дътор. частей	
Сала или тука	
Ядеръ	
Зобъ выйный в под вож понава понава понава по под под под под под под под под под	89
Byah. Hongozogu mino enkomogii	67
	Macy-

	229
month!	стран.
and the state of t	110
rise j mone	142 138
Кашель	плиководо 138 плико 132
Колотье грудное	
— ВЪ животъ	- Rintene ameng 135
Корча плоши	- KSIETOH ENG 37
Костевдица	**************************************
Косшная опухоль	92 94
Костный наростъ	407
Лихорадка воспалительна	124
— Желчная	
Медльнная -	125
Перемежающаяся	100
— Простая любостра	(1
Лишаи	
Ломкость костей -	98 134
Ломота	
Молочница	- drogsos da 86
Мочезадержание -	- джого 141
Мочетечение гнойное	PE PE
Напряжение дътор. уда	E7
Наращение задняго прох	04
Нарость кости	
	жельзы от жели бори 46
НасморкЪ	39
Невстаниха	
Незалупа	- сунововици 32
Низпадение власовЪ	sanda of une since 137
Одышка	
Окобольніе	10
Окрыплость предстат.	ET
Опуходи задняго проход	4a all 3 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 - 5 -
Опухоль костная	00
Опухоль членовЪ	Assert Assert Contract Contrac
Падучая немочь	- manu 127
380 X)(3

-auditta			стран.
Параличь нижнихЪ	удовъ	a din	128
Половины шёл			129
Паховики	•	ovation.	E
Помрачение зрвния		A SOLET	79
Порча ногтей		- No.	ozn 20067
Похоть любостраст	ная	. 0	37
Прекращение кровоочи		anewyn	1 14
Предохранение от .	лю боет	о. бользни	160
ПріапизмЪ	3.0007	постальност	35
Проказа		· KKBP	68
Простуда		a menda	
Пузырки кристалло	видные	MENT MENT	26
Пунырышки детород		a a	27
— Закожные			64
Пяшна закожныя		косщей	62
- Роговой оболоч	ки		74
РакЪ сосновЪ			119
Размягчение костей		Since	97
СвербежЪ		rondows of	67
СвищЪ задняго прох	ода	t ganta e	52
Промежности г	роходно	DE SELECTION NO	50
Слезный	7 - 1	шпора	77
Скирръ предстоящей	жельз	of sections in	48
Скорчение плони	-		36
Слабость		. 27	128
Слинотеченіе		91	140
Слъпота		· dassina si	79
Сожащие задняго проз	хода		53
Соращенія членовЪ		4	100
Спрупья головныя	100	emekorat an	65
Судорга повсюдная	- MAGE!		
Теченіе были	Po	LONGHEST -	102
Трудное мочетечение		SHIP STR	20
Тръщины -		ANDROU	63
MEAN THE	Y 5		Хри-

	231
	стран.
	139
Хрипота	145
Чахотка	63
Чесошка -	89
— Брадная	
ШанкрЪ -	29
Шіагра	135
Язвы дътородных в частей -	109
Закожныя	69
	115
Машки	31
Мочеиспускательнаго ствола	42
Мошенки -	
— Hioбныя	88
— Носовыя	83
Плѣшки	28
Роговой очной оболочки	75
	111
— Рукава машки	118
СосцовЪ	77
ЯчменецЪ	•

Третьей и последней части конець.

CAR MAPOAGGO Pennsa Manufu Toemell n nown Lanch vaceus Kenters.

			77				1	
Inches		2	3 1	4	1 1 2 1 1	1 9 1 1 1		20 -
1 2	3 4	9 9	7 8 9	9 10 11	12 13	14 15	16 17	18 19
Centimetres	TIFFE		Color Control Patches	ol Patch		© The Tiffen Company, 2007		
Blue	Cyan	Green	Yellow	Red	Magenta	White	3/Color	Black

